红薯主要病虫害识别与防治

一、黑斑病

识别：薯苗基部、薯块表面出现黑褐色凹陷病斑，病薯味苦，贮藏期容易腐烂；带病薯苗栽后易死苗。

防治：选用无病种薯，播前温汤浸种或按登记药剂消毒；坚持高剪苗，不带床土；与禾本科作物轮作 3 年以上；旧窖清理消毒，发现病薯及时剔除。

二、茎线虫病

识别：薯块内部糠心、呈海绵状，表皮龟裂；植株矮小、叶片发黄，严重时绝收。

防治：选用抗病品种和无病薯苗；合理轮作；病薯、病蔓不还田、不入窖；药剂处理按当地登记产品标签进行。

三、根腐病

识别：根系变黑腐烂，地上部发黄、萎蔫，严重时成片死苗。

防治：选用徐薯 18 等抗病品种；与禾本科作物轮作；开沟排水，避免田间积水；清除病残体。

四、病毒病

识别：叶片花叶、皱缩、明脉，植株矮化，薯块变小。

防治：使用脱毒薯苗；及时防治蚜虫等传毒媒介；发现病株拔除，避免带病薯苗调运。

五、地下害虫（蛴螬、金针虫）

识别：幼虫咬食薯块，形成孔洞和隧道，降低商品性并引发腐烂。

防治：施用充分腐熟的有机肥；深翻晒垡；灯光或性诱成虫；必要时按登记药剂进行土壤处理或毒饵诱杀。

六、甘薯天蛾、斜纹夜蛾

识别：幼虫取食叶片，严重时叶片被吃光，影响光合作用和产量。

防治：人工捕杀幼虫和蛹；灯光诱杀成虫；优先使用 Bt 等生物农药；化学防治按标签用药，注意安全间隔期。

七、安全用药原则

选用在红薯上登记的产品，严格按标签剂量、施药时期和安全间隔期使用；轮换用药，避免抗性；施药时做好个人防护，剩余药液和包装妥善处理。禁用高毒、剧毒农药。

本文为演示用农技摘要，具体病虫害诊断和用药方案请以当地农技部门发布的病虫情报、农药标签和登记作物为准。