柑橘黄龙病识别与防控

柑橘 检疫性病害

一、识别症状

- 叶片斑驳黄化：黄绿相间、不对称，与缺素黄化不同。
- 新梢黄化、叶片变小，树势逐年衰退。
- 果实“红鼻子果”：果蒂附近先转色，果顶仍青，果小畸形。
- 根系腐烂，严重时整株死亡。

二、传播途径

黄龙病由柑橘木虱传播，也可通过带病苗木和嫁接传播。木虱在嫩梢期活跃，春梢、夏梢和秋梢是重点防治时期。

三、防控原则

目前没有可以治愈黄龙病的药剂，防控核心是“无病苗木、防木虱、清除病树”。

- 使用经过检疫的无病苗木，不从病区调运接穗。
- 统一防治柑橘木虱，嫩梢期按植保指导用药，压低虫口密度。
- 发现病树及时连根清除，清除前先喷药防治木虱，避免带毒木虱扩散。
- 加强肥水管理，提高健康树抗逆性；定期巡查，发现疑似症状及时送检。

> 不要轻信“打针治愈黄龙病”的宣传。确诊病树应以清除为主，避免继续传染周边果园。

四、记录与上报

发现疑似病树时记录位置、症状和数量，拍照留存，并向当地农业技术部门报告。