水稻主要虫害识别与防治

水稻 虫害 综合防治

一、稻飞虱

- 识别：成虫和若虫群集稻株基部刺吸汁液，田间出现“冒穿”“虱烧”，严重时成片枯死。
- 防治指标：分蘖期百丛虫量达到当地防治指标时施药；穗期指标更严，重点保护功能叶和穗部。
- 防治：选用吡蚜酮、烯啶虫胺等登记药剂，喷药时对准稻株中下部；保护蜘蛛、黑肩绿盲蝽等天敌。

二、稻纵卷叶螟

- 识别：幼虫吐丝卷叶，取食叶肉，形成白色条斑；严重时全田“白叶”。
- 防治适期：卵孵高峰至低龄幼虫期，在卷叶前施药效果最好。
- 防治：选用氯虫苯甲酰胺、甲维盐等登记药剂，注意轮换；田间设置性诱剂监测成虫高峰。

三、二化螟

- 识别：幼虫钻蛀茎秆，分蘖期造成枯心，穗期造成白穗、虫伤株。
- 防治：重点抓卵孵高峰和枯鞘期；越冬代成虫期可用性诱剂诱杀，减少基数。
- 农业措施：低茬收割、冬前翻耕、灌水灭蛹，减少越冬虫源。

四、安全用药

项目	要求
药剂选择	使用在水稻上登记的药剂，按标签剂量
轮换用药	不同作用机理药剂交替，延缓抗性
安全间隔期	收获前按标签停止用药
防护	避开高温强风时段，做好个人防护

> 发现大面积突发虫害时，先拍清楚虫态和危害状，及时联系当地植保部门确认，不要盲目加大药量。