

ZO Math · Ôn thi Toán THPT 2027



## Kết nối hàm số, bảng biến thiên và đồ thị

Dấu đạo hàm, tính đơn điệu và cực trị — Bài học

Phiên bản ứng viên v1.2 · [zomath.vn](https://zomath.vn)



[zomath.vn](https://zomath.vn)

Bản PDF này được tạo từ bài viết tương ứng của ZO Math.

© 2026 ZO Math. Bảo lưu mọi quyền.

Có thể học

Học liệu “Kết nối hàm số, bảng biến thiên và đồ thị” là gói củng cố kiến thức nền và chẩn đoán lỗi thuộc chương trình **Ôn thi Toán THPT 2027**. Học liệu giúp em đọc đúng công thức, bảng biến thiên và đồ thị; dùng dấu đạo hàm để giải thích kết luận về tính đơn điệu và cực trị. Em cần biết tính đạo hàm đa thức, xét dấu biểu thức và nhận biết tính liên tục tại một điểm. Bốn câu hỏi khởi động sẽ giúp em xác định phần cần ôn. Bài kiểm tra cuối gói nhằm xác định mức độ em làm chủ những nội dung này; đây không phải là để mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở lời giải. Em có thể học qua nhiều buổi; sau mỗi buổi, ghi vị trí dừng và điều cần hỏi vào nhật kí học tập.

| Phần      | Em thực hiện                                                                                       | Kết quả cần giữ lại                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Học       | Làm bốn câu hỏi khởi động; đọc các mục cần thiết; tự làm câu hỏi trong bài rồi đối chiếu lời giải. | Lập luận của em và điều kiện đã sử dụng.          |
| Luyện tập | Làm tám bài theo thứ tự ở lượt đầu. Đối chiếu từng bài sau khi đã tự giải.                         | Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được. |
| Kiểm tra  | Làm năm bài độc lập, dự kiến 45 phút; đóng bài học và lời giải.                                    | Bài làm ban đầu, thời gian và điểm từng ý.        |
| Sửa lỗi   | Giữ bài làm ban đầu; nêu lỗi, sửa lập luận rồi làm bài tập khắc phục tương ứng.                    | Lí do sửa và kết quả tự làm câu mới.              |
| Ôn lại    | Hẹn một buổi sau để tự nhớ lại kiến thức và kiểm tra phần từng sai.                                | Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.           |

Thời gian 45 phút là thời lượng đề xuất cho bài kiểm tra của học liệu này, có thể điều chỉnh sau khi sử dụng. Tổng điểm 20 dùng để phân tích bài làm, không mô phỏng thang điểm của kì thi THPT.

Cách thực hiện

- Tải bản học và bài tập để tự làm.
- Dùng bản đầy đủ khi cần đối chiếu lời giải.
- Trên màn hình, dùng các liên kết lời giải để mở đúng phần tương ứng.

Bài học

0. Bắt đầu từ đâu?
1. Đơn điệu nói điều gì?
  2. Dấu đạo hàm cho phép kết luận gì?
  3. Một chuỗi biểu diễn được dựng thế nào?
  4. Điều gì xảy ra tại một điểm cần xét?
  5. Cực trị được gọi tên thế nào?
  6. Có thể đọc ngược đến đâu?
  7. Làm sao biết mình đã sửa được lỗi?
- Khép lại bài học

## 0. Bắt đầu từ đâu?

### Cách thực hiện

1. Làm bốn câu hỏi khởi động trên giấy.
  2. Đối chiếu lời giải rồi dùng bảng chỉ dẫn để ôn đúng phần còn vướng.
- Đọc các mục tiêu để biết mình cần làm được gì.

### Câu hỏi dẫn đường

Một công thức đạo hàm, một bảng biến thiên và một đồ thị có thể cùng nói về một hàm số. Nhưng chúng không nói cùng một lượng thông tin. Làm thế nào để chuyển từ biểu diễn này sang biểu diễn khác mà không kết luận thêm điều dữ kiện chưa cho phép?

Trong bài này, em sẽ tập trả lời ba câu hỏi trước mỗi kết luận:

1. Ta đang xét hàm số nào, trên tập xác định và khoảng nào?
2. Dữ kiện đang nói về  $f$ , về  $f'$ , hay chỉ về chiều biến thiên?
3. Điều kiện nào cho phép đi từ dữ kiện đến kết luận?

### Học xong, em cần làm được gì?

| Mục tiêu                         | Việc em cần làm được                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kết nối các biểu diễn của hàm số | Nối công thức, dấu đạo hàm, bảng biến thiên và dáng điệu đồ thị; phát hiện hai biểu diễn không khớp           |
| Xét tính đơn điệu bằng đạo hàm   | Nêu khoảng xét và các điều kiện cần kiểm tra; dùng dấu đạo hàm để kết luận hàm số đồng biến hoặc nghịch biến. |
| Xác định cực trị                 | Kiểm tra điều kiện; phân biệt điểm cực trị của hàm số, giá trị cực trị và điểm cực trị của đồ thị.            |
| Đúng/sai có lí do                | Đánh giá từ giả thiết đã cho; dùng lập luận hoặc phản ví dụ phù hợp                                           |
| Sửa lỗi và vận dụng lại          | Chỉ ra lỗi, viết lại cho đúng rồi làm một câu mới kiểm tra chính lỗi đó                                       |

Bài này không học giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, tiệm cận, tối ưu hoặc toàn bộ quy trình khảo sát hàm số. Chỉ ôn lại kiến thức nền đúng lúc cần dùng.

### Câu hỏi khởi động

Hãy thử trước khi đọc đáp án trong mục “Lời giải các câu hỏi và bài tập trong bài học” ở phần Lời giải cuối tài liệu. Không cần tính điểm; câu nào chưa làm được sẽ chỉ ra phần cần ôn nhanh.

- **Câu hỏi khởi động 01.** Hàm số  $r(x) = \frac{1}{x-2}$  có tập xác định nào? Có thể áp dụng định lí dấu đạo hàm cho  $r$  trên cả khoảng  $(1; 3)$  không?
- **Câu hỏi khởi động 02.** Tính đạo hàm của  $s(x) = x^2 - 2x$  và xác định dấu của đạo hàm ở hai phía của  $x = 1$ .
- **Câu hỏi khởi động 03.** Một bảng biến thiên cho biết  $f$  đồng biến trên  $(-2; 0)$ , đạt giá trị 3 tại  $x = 0$ , rồi nghịch biến trên  $(0; 2)$ . Khi đi từ trái sang phải, mũi tên ở hai khoảng phải hướng thế nào? Số 3 nằm ở hàng  $x$  hay hàng  $f(x)$ ?
- **Câu hỏi khởi động 04.** Một hình được ghi nhãn  $y = f'(x)$ . Trên khoảng  $K$ , toàn bộ đường biểu diễn nằm dưới trục hoành. Dữ kiện này nói  $f(x) < 0$  hay  $f'(x) < 0$ ?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Chọn đúng phần cần ôn

|                      |                                                                  |                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nếu còn vướng        | Ôn nhanh điều này                                                | Quay lại        |
| Câu hỏi khởi động 01 | Mẫu số phải khác 0; một khoảng xét phải nằm trong tập xác định   | Mục 1.1 và 6.4  |
| Câu hỏi khởi động 02 | Đạo hàm đa thức; dấu của biểu thức bậc nhất                      | Mục 2.1 rồi 3.2 |
| Câu hỏi khởi động 03 | Hàng $x$ ghi vị trí; hàng $f(x)$ ghi giá trị và chiều biến thiên | Mục 3.3         |
| Câu hỏi khởi động 04 | Phân biệt nhãn $y = f(x)$ với $y = f'(x)$                        | Mục 6.2         |

Nếu bốn câu đã rõ, đi thẳng vào Mục 1. Nếu thiếu một kĩ thuật nền, chỉ bổ sung kĩ thuật đó; không cần học lại cả chương đạo hàm.

1. Đơn điệu nói điều gì?

Cách thực hiện

- Trả lời câu hỏi mở đầu bằng lời của em.
- Đọc định nghĩa và Ví dụ 01, rồi tự làm Câu hỏi tự kiểm tra 01.
- Khi đối chiếu, kiểm tra xem lập luận đã bao quát mọi cặp điểm trên khoảng xét chưa.

Thử nghĩ trước

Em tính được  $f(0) < f(1) < f(2)$ . Chứng đó đã đủ để khẳng định  $f$  đồng biến trên  $(0; 2)$  chưa? Chưa. Ba giá trị chỉ mô tả ba vị trí. Một kết luận về cả khoảng phải kiểm soát mọi cặp điểm thích hợp trong khoảng ấy.

1.1. Từ “đi lên” đến định nghĩa

Cho hàm số  $y = f(x)$  có tập xác định  $D$ . Xét  $K$  là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng nằm trong  $D$ .

Đơn điệu: Định nghĩa hàm số đồng biến và nghịch biến

- Hàm số **đồng biến** trên  $K$  nếu với mọi  $x_1, x_2$  thuộc  $K$ , khi  $x_1 < x_2$  thì  $f(x_1) < f(x_2)$ .
- Hàm số **nghịch biến** trên  $K$  nếu với mọi  $x_1, x_2$  thuộc  $K$ , khi  $x_1 < x_2$  thì  $f(x_1) > f(x_2)$ .

Hai điều phải giữ nguyên là “với mọi cặp điểm” và “trên  $K$ ”. Khi đọc đồ thị từ trái sang phải, “đi lên” hay “đi xuống” là cách hình dung hai quan hệ ấy, không phải một cách thay thế điều kiện của định nghĩa.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 6.

1.2. Ví dụ 01 — Chứng minh mà chưa dùng đạo hàm

Xét  $f(x) = 2x - 1$  trên  $\mathbb{R}$ . Lấy bất kì  $x_1 < x_2$ . Ta có

$$f(x_2) - f(x_1) = 2(x_2 - x_1) > 0.$$

Vì vậy  $f(x_1) < f(x_2)$ . Hàm số đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .

Nếu thay bằng  $g(x) = -2x + 1$  thì

$$g(x_2) - g(x_1) = -2(x_2 - x_1) < 0.$$

Hàm số  $g$  nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ .

Lập luận này dùng đúng định nghĩa. Đạo hàm sẽ giúp ta xử lý những công thức phức tạp hơn, nhưng không làm thay đổi ý nghĩa của đồng biến, nghịch biến.

### Câu hỏi tự kiểm tra 01

Một bạn viết: “Hàm số  $f$  đồng biến trên  $(a; b)$  vì  $f(a) < f(b)$ .” Chỉ ra hai điều chưa ổn trong lập luận này, kể cả khi hai giá trị ở đầu mút tình cờ tồn tại.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

## 2. Dấu đạo hàm cho phép kết luận gì?

### Cách thực hiện

- Đọc giả thiết của định lý trước kết luận.
- Với Ví dụ 02, đối chiếu dấu đạo hàm, mũi tên trong bảng và đồ thị.
- Tự làm Câu hỏi tự kiểm tra 02.

Phần giải thích bằng giới hạn được đặt trong mục đọc thêm.

### Thử nghĩ trước

Nếu đạo hàm dương ở một điểm thì ta biết điều gì ở điểm đó? Nếu đạo hàm dương trên cả một khoảng thì ta được kết luận thêm điều gì?

Đạo hàm tại một điểm cho biết hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm ấy khi đạo hàm tồn tại. Định lý sau đây mới là căn cứ để đi từ dấu đạo hàm trên một khoảng đến chiều biến thiên trên khoảng đó.

### 2.1. Định lý và phạm vi áp dụng

Cho  $f$  có đạo hàm trên khoảng  $K$ .

#### Đơn điệu: Dấu đạo hàm và chiều biến thiên

- Nếu  $f'(x) > 0$  với mọi  $x$  thuộc  $K$  thì  $f$  đồng biến trên  $K$ .
- Nếu  $f'(x) < 0$  với mọi  $x$  thuộc  $K$  thì  $f$  nghịch biến trên  $K$ .

Khi áp dụng, viết đủ ba ý: hàm số có đạo hàm trên khoảng đang xét; dấu của đạo hàm trên cả khoảng; kết luận chiều biến thiên trên chính khoảng đó.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 7.

Chẳng hạn, với  $s(x) = x^2 - 2x$ , ta có  $D = \mathbb{R}$  và  $s'(x) = 2(x - 1)$ . Đạo hàm âm trên  $(-\infty; 1)$ , dương trên  $(1; +\infty)$ . Do đó  $s$  nghịch biến trên  $(-\infty; 1)$  và đồng biến trên  $(1; +\infty)$ .

Chú ý cách nói: dấu của  $s'$  cho biết chiều biến thiên của  $s$ . Không viết “đạo hàm đồng biến nên hàm số đồng biến”; sự tăng giảm của đạo hàm là thông tin khác với dấu của đạo hàm.

## 2.2. Một số hữu hạn điểm đạo hàm bằng 0

Vẫn giả sử  $f$  có đạo hàm trên khoảng  $K$ . Kết luận trên vẫn đúng nếu đạo hàm giữ dấu nghiêm ngặt tương ứng, chỉ bằng 0 tại một số hữu hạn điểm trong khoảng. Cụ thể:

### Đơn điệu: Đạo hàm bằng 0 tại một số hữu hạn điểm

- $f'(x) \geq 0$  trên  $K$ , và chỉ bằng 0 tại một số hữu hạn điểm, thì  $f$  đồng biến trên  $K$ .
- $f'(x) \leq 0$  trên  $K$ , và chỉ bằng 0 tại một số hữu hạn điểm, thì  $f$  nghịch biến trên  $K$ .

Không được rút gọn thành “đạo hàm có hữu hạn nghiệm thì hàm số đơn điệu”: còn phải kiểm tra dấu ở các điểm còn lại. Cũng không được bỏ điều kiện về các điểm bằng 0 rồi khẳng định đồng biến chỉ từ  $f'(x) \geq 0$ . Ví dụ hàm hằng  $f(x) = 5$  có đạo hàm bằng 0 ở mọi điểm nhưng không đồng biến theo định nghĩa nghiêm ngặt ở Mục 1.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 7.

## 2.3. Ví dụ 02 — Đạo hàm bằng 0 nhưng không đổi chiều

Xét hàm số sau:

$$f(x) = (x - 1)^3 + 2.$$

Hàm số có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và

$$f'(x) = 3(x - 1)^2.$$

Đạo hàm dương với mọi  $x \neq 1$ , chỉ bằng 0 tại  $x = 1$ . Bởi chú ý vừa nêu,  $f$  đồng biến trên toàn bộ  $\mathbb{R}$ .


Giữ mốc  $x = 1$  trong bảng để thấy điều gì xảy ra ở đó:

|         |           |   |   |   |           |
|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |   | 1 |   | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | + | 0 | + |           |
| $f(x)$  | $-\infty$ | ↗ | 2 | ↗ | $+\infty$ |

Bảng biến thiên.

Hai mũi tên đều đi lên, gặp nhau ở giá trị  $f(1) = 2$ . Tiếp tuyến tại điểm  $(1; 2)$  nằm ngang vì hệ số góc bằng  $f'(1) = 0$ , nhưng hàm số không chuyển từ tăng sang giảm hay ngược lại.

Một điểm có tiếp tuyến ngang không làm cho cả một khoảng trở thành đoạn nằm ngang.



Hình 01 — Tiếp tuyến ngang tại (1;2), hàm số vẫn tăng ở hai phía.

## 2.4. Vì sao không được đảo thành điều kiện nghiêm ngặt?

### Không đảo định lý thành dấu nghiêm ngặt.

Ví dụ 02 bác bỏ phát biểu: “Nếu  $f$  đồng biến và có đạo hàm trên  $K$  thì  $f'(x) > 0$  tại mọi điểm của  $K$ .” Hàm số trong ví dụ đồng biến trên  $\mathbb{R}$  nhưng  $f'(1) = 0$ .

Phát biểu đúng là: nếu  $f$  đồng biến và có đạo hàm trên khoảng  $K$ , thì  $f'(x) \geq 0$  với mọi  $x$  thuộc  $K$ . Với hàm nghịch biến và có đạo hàm, kết luận tương ứng là  $f'(x) \leq 0$ .

### Đọc thêm — Giải thích bằng định nghĩa đạo hàm

Có thể hiểu dấu không nghiêm ngặt này từ định nghĩa đạo hàm. Cố định  $x_0$  trong  $K$ . Với  $h \neq 0$  đủ nhỏ, tính đồng biến cho

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} > 0.$$

Khi  $h$  tiến đến 0, giới hạn của các số dương có thể bằng 0. Vì vậy không thể buộc giới hạn ấy phải dương nghiêm ngặt. Đây là giải thích bổ sung của bài học, không phải phát biểu trích nguyên văn định lý ở SGK.

### Câu hỏi tự kiểm tra 02

Cho  $h$  có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và  $h'(x) = (x + 2)^2$ . Hãy kết luận chiều biến thiên trên  $\mathbb{R}$  và phản biện câu: “Phải tách thành hai khoảng đơn điệu vì đạo hàm bằng 0 tại  $-2$ .”

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

### 3. Một chuỗi biểu diễn được dựng thế nào?

#### Cách thực hiện

1. Với Ví dụ 03, tự tính đạo hàm và xét dấu trước khi xem bảng. Tính giá trị tại các mốc.
2. Lập bảng biến thiên rồi phác đồ thị.
3. Làm Câu hỏi tự kiểm tra 03 để kiểm tra sự phù hợp giữa bảng và hình.

#### Thử nghĩ trước

Nếu đã có bảng dấu đạo hàm thì còn thiếu gì để viết được giá trị hàm số tại các mốc? Nếu đã có bảng biến thiên thì đã có duy nhất một đồ thị chính xác chưa?

Ta theo dõi một ví dụ xuyên suốt để thấy mỗi bước dùng và bổ sung thông tin nào.

#### 3.1. Ví dụ 03 — Bắt đầu từ công thức

Xét

$$p(x) = x^3 - 3x + 1.$$

Đây là hàm đa thức nên có tập xác định  $\mathbb{R}$ , liên tục và có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$ . Đạo hàm là

$$p'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1).$$

Các nghiệm của  $p'(x) = 0$  là  $-1$  và  $1$ . Hai mốc này chia trục số thành ba khoảng cần xét dấu.

#### 3.2. Từ đạo hàm đến dấu và chiều biến thiên

| Khoảng          | Dấu $x + 1$ | Dấu $x - 1$ | Dấu $p'(x)$ | Kết luận về $p$ |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| $(-\infty; -1)$ | Âm          | Âm          | Dương       | Đồng biến       |
| $(-1; 1)$       | Dương       | Âm          | Âm          | Nghịch biến     |
| $(1; +\infty)$  | Dương       | Dương       | Dương       | Đồng biến       |

Kết luận này dựa trên dấu trên từng khoảng, không chỉ trên hai đẳng thức  $p'(-1) = 0$  và  $p'(1) = 0$ .

#### 3.3. Từ chiều biến thiên đến bảng biến thiên

Tính các giá trị ở mốc:

$$p(-1) = 3, \quad p(1) = -1.$$

Ngoài ra, từ biểu thức đa thức bậc ba, ta có

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty.$$

Những giới hạn này được xác định từ công thức, không suy ra chỉ từ dấu của đạo hàm. Nếu chưa vững, có thể kiểm tra bằng cách viết  $p(x) = x^3(1 - 3/x^2 + 1/x^3)$  với  $x \neq 0$ .

Bảng biến thiên là:

|         |           |            |      |            |      |            |           |
|---------|-----------|------------|------|------------|------|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |            | $-1$ |            | $1$  |            | $+\infty$ |
| $p'(x)$ |           | $+$        | $0$  | $-$        | $0$  | $+$        |           |
| $p(x)$  | $-\infty$ | $\nearrow$ | $3$  | $\searrow$ | $-1$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

Bảng biến thiên.

Đọc từng hàng theo đúng chức năng:

- Hàng  $x$  ghi các mốc theo thứ tự tăng dần.
- Hàng  $p'(x)$  ghi dấu trên khoảng và giá trị đạo hàm tại các mốc đã tính.
- Hàng  $p(x)$  ghi giá trị hoặc giới hạn đã biết, cùng mũi tên biểu thị chiều biến thiên.

Số  $-1$  xuất hiện ở cả hai hàng nhưng không luôn chỉ cùng một đối tượng:  $x = -1$  là một vị trí, còn  $p(1) = -1$  là một giá trị hàm số.

### 3.4. Từ bảng đến dáng điệu đồ thị

Từ công thức, tính thêm  $p(0) = 1$ . Vì vậy đồ thị đi qua  $C(0; 1)$ , là giao điểm với trục tung. Điểm này giúp định vị đồ thị; nó không phải mốc đổi chiều trong bảng biến thiên.


Đồ thị  $y = p(x)$  phải phù hợp với các thông tin sau:

- Trên  $(-\infty; -1)$ , đường biểu diễn đi lên khi đọc từ trái sang phải và tiến đến điểm  $A(-1; 3)$ .
- Trên  $(-1; 1)$ , đường biểu diễn đi xuống từ  $A$  đến  $B(1; -1)$ ; nó đi qua  $C(0; 1)$  do giá trị đã tính từ công thức.
- Trên  $(1; +\infty)$ , đường biểu diễn đi lên từ  $B$ .
- Đồ thị liên tục tại hai mốc vì  $p$  liên tục; các tiếp tuyến tại  $A$  và  $B$  nằm ngang vì đạo hàm tại đó bằng 0.

Đây là những ràng buộc để phác đúng dáng điệu, chưa phải toàn bộ quy trình khảo sát hàm số. Không tự thêm một giao điểm, tọa độ hoặc tính chất hình học chưa có căn cứ.

Nếu một hình gấn nhãn  $y = p(x)$  lại đi lên trên  $(-1; 1)$ , hình ấy mâu thuẫn với bảng. Nếu một bảng đặt  $p(-1) = -1$ , bảng ấy mâu thuẫn với công thức. Kiểm tra chéo giúp tìm lỗi ngay tại mắt xích tạo ra nó.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 7–8; Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 4, trang 26–27.

Hình 02 — Đồ thị khớp bảng biến thiên của  $p$ .**Câu hỏi tự kiểm tra 03**

Một bản vẽ cho Ví dụ 03 đi qua đúng  $A(-1; 3)$  và  $B(1; -1)$ , nhưng có một đoạn đi lên nằm bên trong  $(-1; 1)$ . Bản vẽ có thể được chấp nhận vì đã đặt đúng hai điểm mốc không? Nêu đủ kiện quyết định.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

**4. Điều gì xảy ra tại một điểm cần xét?****Cách thực hiện**

- So sánh lần lượt bốn tình huống: đổi dấu, không đổi dấu, không có đạo hàm tại mốc, và mốc không thuộc tập xác định.
- Mỗi lần kết luận, chỉ rõ tính liên tục và dấu ở hai phía.
- Cuối mục, tự làm Câu hỏi tự kiểm tra 04.

**Thử nghĩ trước**

Cùng có đạo hàm bằng 0, tại sao có điểm làm hàm số đổi chiều còn có điểm không? Một điểm không có đạo hàm có thể vẫn là nơi hàm số đổi chiều không?

Trước hết, hãy hình dung: khi hàm số đạt cực đại tại một điểm, giá trị tại đó lớn hơn các giá trị tại những điểm khác ở đủ gần hai phía. Với cực tiểu, giá trị tại điểm đang xét nhỏ hơn các giá trị ở những điểm khác đủ gần hai phía. Định nghĩa đầy đủ và cách gọi tên sẽ được viết ở Mục 5.

**4.1. Điều kiện đủ qua dấu đạo hàm**

Giả sử  $f$  liên tục trên khoảng  $(a; b)$  chứa  $x_0$  và có đạo hàm trên hai khoảng  $(a; x_0)$ ,  $(x_0; b)$ .

**Cực trị: Điều kiện đủ qua dấu đạo hàm**

- Nếu  $f'(x) > 0$  trên  $(a; x_0)$  và  $f'(x) < 0$  trên  $(x_0; b)$ , hàm số đạt cực đại tại  $x_0$ .
- Nếu  $f'(x) < 0$  trên  $(a; x_0)$  và  $f'(x) > 0$  trên  $(x_0; b)$ , hàm số đạt cực tiểu tại  $x_0$ .

Đó là định lí điều kiện đủ đang dùng. Định lí không đòi hỏi đạo hàm phải tồn tại tại chính  $x_0$ . Tính liên tục tại  $x_0$  phải được kiểm tra; việc có đạo hàm ở hai phía không tự bảo đảm điều đó.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 10.

Khi các điều kiện trên đã được bảo đảm, có thể tóm tắt hành vi như sau:

| Dấu đạo hàm bên trái          | Dấu đạo hàm bên phải          | Chiều biến thiên quanh $x_0$ | Kết luận tại $x_0$ |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Dương trên cả khoảng bên trái | Âm trên cả khoảng bên phải    | Tăng rồi giảm                | Cực đại            |
| Âm trên cả khoảng bên trái    | Dương trên cả khoảng bên phải | Giảm rồi tăng                | Cực tiểu           |
| Dương trên cả khoảng bên trái | Dương trên cả khoảng bên phải | Giữ chiều tăng               | Không có cực trị   |
| Âm trên cả khoảng bên trái    | Âm trên cả khoảng bên phải    | Giữ chiều giảm               | Không có cực trị   |

Hai dòng cuối là kết luận trong tình huống có dấu nghiêm ngặt ở mỗi phía và liên tục tại điểm nối. Không dùng câu tắt “không đổi dấu thì không có cực trị” cho một bảng thiếu điều kiện hoặc chưa xác định được dấu trên cả hai khoảng.

**4.2. Đối chứng thứ nhất — Đổi dấu và có cực trị**

Với  $p(x) = x^3 - 3x + 1$  trong Ví dụ 03, tính liên tục đã có vì  $p$  là đa thức.

Qua  $x = -1$ , đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm. Hàm số đạt cực đại tại  $x = -1$ , với giá trị  $p(-1) = 3$ .

Qua  $x = 1$ , đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương. Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 1$ , với giá trị  $p(1) = -1$ .

Ta không kết luận có cực trị chỉ vì giải được phương trình  $p'(x) = 0$ . Bước quyết định là kiểm tra dấu hai phía trong những điều kiện phù hợp.

**4.3. Đối chứng thứ hai — Bằng 0 nhưng không có cực trị**

Trở lại  $f(x) = (x - 1)^3 + 2$  trong Ví dụ 02. Hàm số liên tục tại 1, đạo hàm dương trên cả hai phía của 1 và bằng 0 tại 1.

Với  $x < 1$ , ta có  $f(x) < 2$ . Với  $x > 1$ , ta có  $f(x) > 2$ . Do đó, dù xét gần 1 đến đâu, vẫn có giá trị nhỏ hơn  $f(1)$  ở bên trái và lớn hơn  $f(1)$  ở bên phải. Hàm số không đạt cực đại hoặc cực tiểu tại 1.

Kết luận cần nhớ là:  $f'(x_0) = 0$  tạo ra một điểm cần xét, không tự xác nhận một điểm cực trị.

Nguồn đối chiếu: chú ý về  $x^3$  trong Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 11.

**4.4. Đối chứng thứ ba — Không có đạo hàm nhưng có cực trị**

Xét Ví dụ 04:

$$u(x) = |x|.$$

Hàm số xác định và liên tục trên  $\mathbb{R}$ , với  $u(0) = 0$ . Trên hai phía của 0:

- Nếu  $x < 0$  thì  $u(x) = -x$ , nên  $u'(x) = -1$ .
- Nếu  $x > 0$  thì  $u(x) = x$ , nên  $u'(x) = 1$ .

Tại 0, thương sai phân là

$$\frac{u(h) - u(0)}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

Thương này bằng  $-1$  khi  $h < 0$  và bằng  $1$  khi  $h > 0$ . Hai giới hạn một phía khác nhau nên  $u'(0)$  không tồn tại.

Tuy nhiên, đạo hàm đổi từ âm sang dương qua 0, và  $u$  liên tục tại 0. Theo định lý,  $u$  đạt cực tiểu tại 0. Có thể kiểm tra trực tiếp: với mọi  $x \neq 0$ ,  $u(x) = |x| > 0 = u(0)$ , nên điều kiện so sánh nghiêm ngặt quanh 0 được thỏa mãn.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 6 và 14.

|         |           |   |               |   |           |
|---------|-----------|---|---------------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |   | 0             |   | $+\infty$ |
| $u'(x)$ |           | − | Không tồn tại | + |           |
| $u(x)$  | $+\infty$ | ↘ | 0             | ↗ | $+\infty$ |

Bảng biến thiên của  $u(x) = |x|$ .

Hàng đạo hàm không có giá trị tại 0, nhưng hàng hàm số vẫn có  $u(0) = 0$ . Không được dùng vạch ngăn tại điểm không thuộc tập xác định ở hàng hàm số để xóa mất điểm này. Đồ thị có một góc tại  $(0; 0)$ ; đó không phải một điểm bị bỏ khỏi đồ thị.

#### 4.5. Tách riêng điểm không thuộc tập xác định

##### Điểm không thuộc tập xác định.

Xét  $v(x) = |x|$  nhưng chỉ trên tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Trên mỗi phía của 0, công thức và dấu đạo hàm giống Ví dụ 04. Tuy nhiên,  $v(0)$  không tồn tại vì 0 đã bị loại khỏi tập xác định.


Vì vậy, 0 không thể là điểm cực trị của  $v$ . Dấu âm bên trái và dấu dương bên phải không tạo ra một giá trị hàm số tại vị trí không thuộc tập xác định.

|         |           |     |   |     |           |
|---------|-----------|-----|---|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |     | 0 |     | $+\infty$ |
| $v'(x)$ |           | −   |   | +   |           |
| $v(x)$  | $+\infty$ | ↘ 0 |   | 0 ↗ | $+\infty$ |

Bảng biến thiên khi loại 0 khỏi tập xác định.

Hai số 0 ở hai phía của vạch ngăn là giới hạn một phía. Hàm số không có giá trị tại 0.

Khi dựng bảng, phải thể hiện vạch ngăn tại điểm không thuộc tập xác định qua hàng hàm số; nếu ghi giới hạn tại mốc thì đó là giới hạn, không phải  $v(0)$ . Khi dựng đồ thị, vị trí  $(0; 0)$  phải là điểm hở. Đây là sự khác biệt quyết định với Ví dụ 04.



Hình 03 — Cùng đường nét hai phía nhưng khác việc giữ hay bỏ điểm tại gốc.

#### 4.6. Trình tự xét một mốc

##### Trình tự xét một mốc.

1. Mốc có thuộc tập xác định không? Nếu không, loại khỏi danh sách điểm cực trị.
2. Có một khoảng quanh mốc đáp ứng các điều kiện của định lý không? Kiểm tra riêng tính liên tục tại mốc.
3. Đạo hàm mang dấu gì trên từng khoảng ở hai phía?
4. Hàm số đổi chiều hay giữ chiều? Kết luận theo trường hợp đã kiểm tra.
5. Nếu có cực trị, tính giá trị hàm số và gọi đúng đối tượng.

Nếu thiếu giả thiết, ghi “chưa đủ điều kiện áp dụng định lý”; không chuyển câu đó thành “chắc chắn không có cực trị”.

##### Câu hỏi tự kiểm tra 04

Cho  $w$  liên tục trên  $(-2; 2)$ , có đạo hàm trên  $(-2; 0)$  và  $(0; 2)$ ; đạo hàm dương trên khoảng bên trái, âm trên khoảng bên phải. Biết  $w(0) = 5$  nhưng chưa biết  $w'(0)$  có tồn tại hay không. Có kết luận được cực trị tại 0 không? Vì sao?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

## 5. Cực trị được gọi tên thế nào?

### Cách thực hiện

1. Đọc định nghĩa rồi trở lại Ví dụ 03.
2. Viết riêng ba đối tượng: điểm cực trị của hàm số, giá trị cực trị và điểm cực trị của đồ thị.
3. Hoàn thành Câu hỏi tự kiểm tra 05 để kiểm tra cách dùng thuật ngữ.

### Thử nghĩ trước

Với Ví dụ 03, câu “cực đại là  $-1$ ” có đủ rõ không? Người viết đang nói về hoành độ, giá trị hàm số hay một điểm trên đồ thị?

### 5.1. Định nghĩa theo so sánh trong một lân cận

Xét  $f$  xác định và liên tục trên khoảng  $(a; b)$ , với  $x_0$  thuộc khoảng đó.

#### Cực trị: Định nghĩa trong một lân cận

- Hàm số đạt **cực đại tại**  $x_0$  nếu có số  $h > 0$  sao cho  $(x_0 - h; x_0 + h)$  nằm trong  $(a; b)$ , và với mọi  $x$  trong khoảng nhỏ này, khác  $x_0$ , ta có

$$f(x) < f(x_0).$$

- Hàm số đạt **cực tiểu tại**  $x_0$  nếu tồn tại một khoảng nhỏ như trên mà với mọi  $x \neq x_0$  trong khoảng ấy, ta có

$$f(x) > f(x_0).$$

Từ “gần” được làm chính xác bằng việc tồn tại một khoảng nhỏ quanh  $x_0$ . Các bất đẳng thức là nghiêm ngặt. Không cần so sánh với mọi điểm trong toàn bộ tập xác định.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 9.

Trong bài học này, ta dùng định nghĩa hai phía trên khoảng như trên. Một đầu mút của tập xác định không được tự động phân loại là cực trị bằng quy tắc hai phía. Những quy ước mở rộng khác không thuộc phạm vi bản học liệu này.

5.2. Ba đối tượng cần tách biệt

| Đối tượng                  | Dạng viết          | Cực đại của Ví dụ 03 | Cực tiểu của Ví dụ 03 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Điểm cực trị của hàm số    | Hoành độ $x_0$     | $x = -1$             | $x = 1$               |
| Giá trị cực trị của hàm số | Giá trị $f(x_0)$   | $p(-1) = 3$          | $p(1) = -1$           |
| Điểm cực trị của đồ thị    | Điểm có hai tọa độ | $A(-1; 3)$           | $B(1; -1)$            |

Cách viết rõ ràng là: “Hàm số  $p$  đạt cực đại tại  $x = -1$ , giá trị cực đại bằng 3; điểm cực đại của đồ thị là  $A(-1; 3)$ .”

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 9.

Trong suy luận qua dấu đạo hàm, chủ thể được kết luận đạt cực trị là hàm số  $p$ , không phải tự động là hàm đạo hàm  $p'$ . Đạo hàm cũng là một hàm số, nhưng nếu muốn bàn về cực trị của nó thì đó là một câu hỏi khác.

5.3. “Cục bộ” có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của “cục bộ”.

Trong Ví dụ 03,  $p$  đạt cực đại tại  $-1$  với giá trị 3. Nhưng  $p(3) = 19 > 3$ . Điều này không mâu thuẫn: cực đại ở  $-1$  chỉ yêu cầu so sánh với các điểm đủ gần  $-1$ .

Tương tự, từ việc  $p$  đạt cực tiểu tại 1, không được kết luận mọi giá trị của  $p$  trên  $\mathbb{R}$  đều lớn hơn hoặc bằng  $p(1)$ . Chúng ta dừng ở ý nghĩa cục bộ, không chuyển sang bài toán so sánh trên toàn tập xác định.

Câu hỏi tự kiểm tra 05

Sửa câu sau mà vẫn giữ các số đúng: “Đồ thị của  $p(x) = x^3 - 3x + 1$  có điểm cực tiểu bằng  $-1$  tại giá trị 1.” Hãy viết riêng điểm cực tiểu của hàm số, giá trị cực tiểu và điểm cực tiểu của đồ thị.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

6. Có thể đọc ngược đến đâu?

Ở Mục 5, em đã tập gọi đúng đối tượng cực trị. Bây giờ cần kiểm tra thêm một việc: từ bảng, hình hoặc đạo hàm đã cho, ta thực sự biết được bao nhiêu về những đối tượng ấy?

Cách thực hiện

- Trước mỗi bảng hoặc hình, đọc nhãn và xác định dữ kiện nói về hàm số hay đạo hàm.
- Với mỗi kết luận, nêu dữ kiện làm căn cứ.
- Tự làm Câu hỏi tự kiểm tra 06; không dùng tung độ trên đồ thị đạo hàm thay cho giá trị của hàm số.

Thử nghĩ trước

Một mũi tên đi lên trong bảng biến thiên có đủ để viết dấu  $+$  ở mọi điểm của hàng đạo hàm không? Một đường cong đang đi xuống có luôn biểu diễn một hàm số âm không?

Hai câu hỏi này buộc ta tách chiều biến thiên khỏi dấu của giá trị, đồng thời đọc đúng đối tượng được biểu diễn.

Trong cả Mục 6, mỗi lần đọc ngược, hãy dừng ở ba câu hỏi:

1. Dữ kiện đang nói về  $f$ ,  $f'$  hay chỉ về chiều biến thiên?
2. Kết luận nào theo trực tiếp từ dữ kiện ấy?
3. Muốn kết luận thêm thì còn thiếu giả thiết hoặc giá trị nào?

### 6.1. Bảng có hàng đạo hàm và bảng chỉ có chiều biến thiên

#### Phân biệt dữ kiện về đạo hàm và chiều biến thiên.

Nếu bảng ghi rõ  $f'(x) > 0$  trên một khoảng, đó là dữ kiện về đạo hàm. Nếu bảng chỉ có mũi tên đi lên ở hàng  $f(x)$ , ta biết hàm số đồng biến trên khoảng được biểu diễn; chưa được tự thêm dấu đạo hàm nghiêm ngặt tại mọi điểm.

Nếu có thêm giả thiết hàm số có đạo hàm trên khoảng ấy, ta kết luận được  $f'(x) \geq 0$ . Ví dụ 02 cho thấy dấu bằng có thể xảy ra ở một điểm trong khi mũi tên vẫn đi lên ở cả hai phía.

Khi một ô không có số, hãy xác định đó là ô không cần ghi, chưa có dữ kiện, hay đạo hàm không tồn tại. Không có quy tắc “ô trống nghĩa là bằng 0”. Trong bản này, trường hợp không tồn tại được ghi bằng chữ để tránh nhầm lẫn.

### 6.2. Đồ thị của $f$ khác đồ thị của $f'$

| Điều quan sát được trên khoảng $K$           | Nếu nhãn là $y = f(x)$        | Nếu nhãn là $y = f'(x)$                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Đường biểu diễn nằm trên trục hoành          | $f(x) > 0$                    | $f'(x) > 0$ ; từ đó kết luận $f$ đồng biến trên $K$                             |
| Đường biểu diễn nằm dưới trục hoành          | $f(x) < 0$                    | $f'(x) < 0$ ; từ đó kết luận $f$ nghịch biến trên $K$                           |
| Đường biểu diễn đi lên từ trái sang phải     | $f$ đồng biến                 | $f'$ đồng biến; riêng điều này chưa quyết định $f$ đồng biến hay nghịch biến    |
| Đường biểu diễn đi qua một điểm có tung độ 0 | Giá trị của $f$ tại đó bằng 0 | Đạo hàm của $f$ tại đó bằng 0; cần xem thêm dấu hai phía để xét cực trị của $f$ |


Các kết luận đọc hình được hiểu trên phần tập xác định và với độ chính xác mà đề bài thực sự cung cấp. Hình chỉ có tính minh họa, không ghi tọa độ chính xác thì không đủ để buộc một đáp số chính xác.

#### Ví dụ 05 — Đạo hàm đang tăng nhưng hàm số đang giảm.

Xét lại  $s(x) = x^2 - 2x$ . Đồ thị đạo hàm là đường thẳng  $y = 2x - 2$ , đi lên từ trái sang phải. Tuy nhiên, trên  $(0; 1)$  đường thẳng này nằm dưới trục hoành:  $s'(x) < 0$ . Do đó  $s$  nghịch biến trên  $(0; 1)$ .

Cần đọc vị trí của đồ thị  $s'$  so với trục hoành để tìm dấu, không dùng việc đường thẳng ấy đang đi lên để kết luận chiều biến thiên của  $s$ .

Nguồn đối chiếu: dạng bài đọc đồ thị đạo hàm trong Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 14, bài tập 1.6.



Hình 04 — Hai nhãn khác nhau:  $s$  đang giảm trong khi  $s'$  đang tăng và mang giá trị âm trên  $(0;1)$ .

### 6.3. Cùng bảng tóm tắt không có nghĩa cùng công thức

**Cùng bảng tóm tắt.** Xét hai hàm số trong Ví dụ 06:

$$a(x) = x^3, \quad b(x) = 2x^3.$$

Chúng có cùng tập xác định  $\mathbb{R}$ , cùng dấu đạo hàm dương ở hai phía của 0, đạo hàm bằng 0 tại 0, cùng giá trị bằng 0 tại đó và cùng các giới hạn ở hai đầu. Vì vậy chúng có cùng bảng biến thiên tóm tắt sau, với  $F$  lần lượt là  $a$  hoặc  $b$ :


|         |           |   |   |   |           |
|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |   | 0 |   | $+\infty$ |
| $F'(x)$ |           | + | 0 | + |           |
| $F(x)$  | $-\infty$ | ↗ | 0 | ↗ | $+\infty$ |

Bảng biến thiên.

Nhưng  $a(1) = 1$  còn  $b(1) = 2$ , nên hai đồ thị không trùng nhau. Một bảng ghi dấu, mốc và chiều biến thiên không đủ để xác định duy nhất công thức hàm số.

**Biết chính xác đạo hàm vẫn chưa đủ biết mọi giá trị của hàm số.** Cũng cần phân biệt “biết dấu của đạo hàm” với “biết chính xác hàm đạo hàm”. Hai dữ kiện ấy không tương đương. Chẳng hạn

$x^3$  và  $x^3 + 4$  có cùng đạo hàm nhưng khác giá trị tại 0, nên riêng đạo hàm chưa xác định được vị trí đúng của đồ thị hàm số. Bài này không đặt nhiệm vụ khôi phục công thức từ đạo hàm.



Hình 05 — Hai hàm khác nhau có cùng bảng biến thiên tóm tắt.

#### 6.4. Vì sao không tự gộp các khoảng rời nhau?

Xét Ví dụ 07 với tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ :

- $q(x) = x + 2$  khi  $x < 0$ ;
- $q(x) = x - 2$  khi  $x > 0$ .

Trên mỗi khoảng  $(-\infty; 0)$  và  $(0; +\infty)$ , đạo hàm đều bằng 1. Do đó  $q$  đồng biến trên từng khoảng ấy.

Tuy nhiên, lấy hai điểm thuộc hai khoảng khác nhau:

$$-1 < 1, \quad q(-1) = 1 > -1 = q(1).$$

Vì vậy, nếu mở rộng yêu cầu so sánh mọi cặp điểm ra toàn tập  $D$ , tính đồng biến không được thỏa mãn. Định lý trên một khoảng không cho phép tự động nối hai kết luận riêng thành một kết luận trên hợp các khoảng.

Trong bài làm của gói này, cách kết luận chuẩn là: “ $q$  đồng biến trên từng khoảng  $(-\infty; 0)$  và  $(0; +\infty)$ .” Không gọi hợp hai khoảng ấy là “một khoảng”.

Đừng thay lỗi “luôn gộp được” bằng một quy tắc sai khác là “hợp các khoảng luôn sai”. Kí hiệu hợp không tự làm mọi phát biểu sai. Ví dụ,  $r(x) = x$  trên  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  vẫn thỏa mãn so sánh đồng biến cho mọi cặp điểm thuộc tập xác định. Điểm mấu chốt là phải kiểm tra cả các cặp nằm ở hai thành phần khác nhau; không chỉ xét dấu đạo hàm riêng từng nhánh.

6.5. Bản đồ giới hạn suy luận

| Dữ kiện xuất phát             | Kết luận có căn cứ                                                        | Điều không được tự thêm                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Công thức $f$ và tập xác định | Giá trị, đạo hàm, dấu và chiều biến thiên sau khi tính, kiểm tra          | Một kết luận đơn điệu hoặc cực trị chưa có lập luận                      |
| Dấu của $f'$ trên các khoảng  | Chiều biến thiên; vị trí cực trị nếu đủ điều kiện                         | Giá trị cực trị, giao điểm hoặc giới hạn chưa được cho hoặc tính         |
| Bảng biến thiên               | Chiều biến thiên, mốc và giá trị được ghi; cực trị nếu đủ kiện cho phép   | Công thức duy nhất; mọi giá trị đạo hàm chính xác                        |
| Đồ thị $f$                    | Đơn điệu, cực trị và tọa độ trong giới hạn thông tin của hình             | Có đạo hàm tại một điểm góc; dấu đạo hàm nghiêm ngặt từ riêng nét đi lên |
| Đồ thị $f'$                   | Dấu của đạo hàm; chiều biến thiên của $f$ và xét cực trị khi đủ điều kiện | Coi tung độ của hình là giá trị $f(x)$                                   |

Câu hỏi tự kiểm tra 06

Cho  $f$  có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$ . Đồ thị  $y = f'(x)$  nằm dưới trục hoành khi  $x < 2$ , đi qua  $(2; 0)$  và nằm trên trục hoành khi  $x > 2$ .

Hãy cho biết khoảng đơn điệu và vị trí cực trị của  $f$ . Có đủ dữ kiện để kết luận giá trị cực trị bằng 0 không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

7. Làm sao biết mình đã sửa được lỗi?

Cách thực hiện

- 1. Phân tích phát biểu sai trong Ví dụ 08 và giữ lại phần đúng.
- 2. Tự làm bài tập khắc phục lỗi mẫu trước khi mở lời giải.
- 3. Ghi rõ điều đã sửa và câu mới em đã tự làm vào nhật kí học tập.

Thử nghĩ trước

Em đã đọc lời giải và thấy hợp lí. Điều đó có chứng minh em sẽ không mắc lại lỗi khi câu hỏi đổi từ công thức sang bảng dấu không?

Chưa. Đọc hiểu lời chữa và tự làm đúng một câu mới là hai bằng chứng khác nhau. Mục này hướng dẫn cách sửa lỗi đầy đủ, không chỉ đổi nhãn “sai” thành “đúng”.

Mục 6 giúp em kiểm tra một kết luận có vượt quá dữ kiện hay không. Mục 7 dùng chính cách kiểm tra ấy để tách từng vế của một phát biểu, giữ phần đúng và sửa đúng chỗ sai.

7.1. Đánh giá từ đúng giả thiết

Đánh giá từng kết luận từ giả thiết đã cho.

Với một cụm phát biểu dùng chung giả thiết, xét từng ý độc lập từ giả thiết đó. Không xem kết luận của ý trước là dữ kiện cho ý sau, nhất là khi ý trước chính là điều đang cần kiểm tra.

Trước khi đánh giá, viết nháp ba dòng: tập xác định và khoảng; dữ kiện đã cho; kết luận đang được hỏi. Sau đó mới chọn định nghĩa, định lí hoặc phản ví dụ phù hợp.

| Cấu trúc phát biểu      | Khi nào đúng?                                       | Căn cứ đủ để bác bỏ                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| “A và B”                | Cả A và B đều đúng                                  | Chỉ ra ít nhất một vế sai                            |
| “A hoặc B”              | Ít nhất một vế đúng                                 | Phải chỉ ra cả A và B đều sai                        |
| “Với mọi trường hợp...” | Có lập luận bao quát mọi trường hợp trong giả thiết | Một phản ví dụ thỏa giả thiết nhưng vi phạm kết luận |

Ở đây “hoặc” được dùng theo nghĩa ít nhất một vế đúng, không mặc định loại trừ trường hợp cả hai đúng. Một số ví dụ đúng không chứng minh được phát biểu “mọi”; một phản ví dụ phù hợp có thể bác bỏ phát biểu ấy.

## 7.2. Ví dụ 08 — Giữ phần đúng khi sửa

Cho  $f(x) = (x - 1)^3 + 2$  trên  $\mathbb{R}$ . Xét phát biểu:

Hàm số  $f$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$  và đạt cực đại tại  $x = 1$  vì  $f'(1) = 0$ .

**Đánh giá:** sai.

**Tách các vế:** vế đồng biến đúng theo Ví dụ 02; vế đạt cực đại tại 1 sai vì đạo hàm dương ở cả hai phía và hàm số không đổi chiều.

**Lỗi quyết định:** xem phương trình  $f'(1) = 0$  như điều kiện đủ của cực trị. Nếu xóa luôn vế đồng biến khi chữa, ta còn làm mất một phần vốn đúng.

**Viết lại hoàn chỉnh:** “Hàm số  $f$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$  và không đạt cực trị tại  $x = 1$ ; mặc dù  $f'(1) = 0$ , đạo hàm vẫn dương ở cả hai phía của 1.”

Lời chữa cần có lí do. Chỉ viết “không có cực trị” thì chưa cho thấy em đã thay đổi cách suy luận.

## 7.3. Bài tập khắc phục lỗi mẫu

Đổi dạng dữ kiện từ công thức hàm số sang công thức đạo hàm. Cho  $g$  có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và

$$g'(x) = (x - 2)^2(x + 1).$$

Chưa cho giá trị nào của  $g$ . Hãy tự làm bốn việc:

### Lượt 1 — Xét dấu và cực trị

- Lập bảng dấu  $g'$  với các mốc  $-1$  và  $2$ .
- Kết luận các khoảng đơn điệu; xem có thể kết luận đồng biến trên toàn khoảng  $(-1; +\infty)$  không.
- Xác định mốc nào là điểm cực trị, mốc nào không; nêu lí do.

### Lượt 2 — Kiểm tra giới hạn của dữ kiện

- Chưa cho giá trị nào của  $g$ . Có tính được giá trị cực trị chỉ từ công thức  $g'$  hay không?

Chỉ mở lời giải Bài tập khắc phục lỗi mẫu trong mục “Lời giải các câu hỏi và bài tập trong bài học” ở phần Lời giải cuối tài liệu sau khi đã tự viết. Câu này kiểm tra lại lỗi “điểm có đạo hàm bằng 0 là điểm cực trị”, đồng thời yêu cầu không tự thêm giá trị hàm số từ dữ kiện về đạo hàm. Nó không chỉ thay số trong Ví dụ 08.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

7.4. Một dòng ghi lỗi có ích

Một dòng ghi lỗi có ích.

Sau khi đối chiếu, ghi ngắn gọn theo mẫu:

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nội dung cần ghi | Minh họa cho lỗi “coi đạo hàm bằng 0 là đủ để có cực trị”                                                |
| Bước đã sai      | Kết luận có hai điểm cực trị vì đạo hàm có hai nghiệm                                                    |
| Điều đã bỏ       | Chưa kiểm tra dấu hai phía của từng nghiệm                                                               |
| Cách sửa         | Xét dấu; chỉ dùng định lí khi đủ giả thiết và có đổi dấu phù hợp                                         |
| Câu kiểm tra lại | Bài tập khắc phục lỗi mẫu                                                                                |
| Bằng chứng       | Ghi kết quả bài tự làm và lí do ở từng mốc, không chép sẵn “đã đúng”                                     |
| Việc tiếp theo   | Nếu còn nhầm tại 2, quay lại Ví dụ 02 rồi làm một câu mới khác; nếu đã rõ, chuyển sang nhiệm vụ phối hợp |

Chỉ ghi “đã sửa trong lượt này” khi câu mới được làm đúng với lí do phù hợp. Một lượt đúng chưa thay thế cho việc kiểm tra độc lập và ôn lại sau đó. Ngày ôn lại được ghi từ lỗi và kết quả thực tế, không ấn định cùng một lịch cho mọi người.

7.5. Tám lỗi để tự nhận diện

| Số | Dấu hiệu của lỗi                                               | Câu hỏi giúp tự sửa                                          |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Bỏ tập xác định hoặc khoảng xét                                | Mọi điểm đang dùng có thuộc tập xác định không?              |
| 2  | Đạo hàm bằng 0 nên có cực trị                                  | Dấu ở hai phía là gì?                                        |
| 3  | Không có đạo hàm nên không có cực trị                          | Hàm có xác định, liên tục và đổi chiều phù hợp tại đó không? |
| 4  | Nhầm hoành độ, giá trị và điểm đồ thị                          | Câu hỏi đang đòi $x_0$ , $f(x_0)$ hay cả cặp tọa độ?         |
| 5  | Gộp các khoảng rồi một cách tự động                            | Đã kiểm tra cặp điểm thuộc hai nhánh khác nhau chưa?         |
| 6  | Đảo định lí thành dấu nghiệm ngặt                              | Ví dụ 02 có bác bỏ kết luận này không?                       |
| 7  | Thêm thông tin không có trong hình hoặc bảng                   | Dữ kiện nào thực sự cho biết điều vừa viết?                  |
| 8  | Xử lí sai “và”, “hoặc”, “mọi”, hoặc làm mất phần đúng khi chữa | Từng vế đúng hay sai, và kết nối logic yêu cầu điều gì?      |

Hãy nhận diện lỗi trong từng lập luận, rồi chọn việc cần sửa.

Khép lại bài học

Một lời giải tốt không chỉ kết thúc bằng “đồng biến”, “nghịch biến” hoặc “cực trị”. Nó cho thấy đúng hàm số, đúng tập xác định, đúng điều kiện và đúng chiều suy luận.

Trước khi chuyển sang phần luyện tập, hãy tự nói lại năm điều:

1. Đơn điệu được định nghĩa bằng so sánh giá trị trên một tập đang xét; dấu đạo hàm là công cụ để kết luận khi đủ điều kiện.
2. Một điểm đạo hàm bằng 0 chưa quyết định được cực trị; một điểm không có đạo hàm cũng chưa loại trừ cực trị.
3. Bảng dấu, bảng biến thiên và đồ thị phải nhất quán về đối tượng, tập xác định, mốc và chiều biến thiên.
4. Một bảng hoặc hình không cho phép suy ra mọi điều về hàm số; phải phân biệt điều được cho với điều tự thêm.
5. Sửa lỗi cần kết thúc bằng một câu mới tự làm, không chỉ bằng việc đọc lời giải.

Nếu chưa giải thích được một ý, quay lại ví dụ tương ứng trước khi làm nhiệm vụ phối hợp. Các câu hỏi tự kiểm tra trong bài chỉ giúp kiểm tra ngay sau khi học; chúng không phải bằng chứng độc lập rằng em đã đạt tất cả mục tiêu của bài học.

### Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), phần lớp 12, trang 105–106: tính đơn điệu, bảng biến thiên, điểm cực trị và giá trị cực trị.
- *Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, Bài 1, trang in 6–11 và 14 (trang PDF 8–13 và 16 trong bản được cung cấp); Bài 4, trang in 26–27 (trang PDF 28–29).

Các định nghĩa và điều kiện áp dụng được đối chiếu với SGK. Ví dụ, câu hỏi, phản ví dụ, lời giải và thang điểm trong học liệu do ZO Math biên soạn. Bản SGK đối chiếu có ghi “Bản mẫu”; số trang nêu trên gắn với bản này.

### Kết thúc học liệu “Kết nối hàm số, bảng biến thiên và đồ thị”.

Trở lại gói học liệu trực tuyến

