

Astronomijos pradmenų konspektas

V. dalis
Kometos

Autorius: GB

2026 m.
Redakcija 1.0

EQUI DENTES INSPICERE DONATI

(St. Hieronymus, Commentariorum in Epistolam ad Ephesios Libri Tres)

DOVANOTAM ARKLIUI Į DANTIS NEŽIŪRIMA

(Šv. Jeronimas, Commentariorum in Epistolam ad Ephesios Libri Tres)

Iliustracijos (išskyrus IAU žvaigždėlapiai) parengtos naudojant Pyhton atvirojo kodo skriptus ir Inkscape atvirojo kodo vektorinės grafikos redaktorių.

IAU žvaigždėlapiai: Autorius: IAU and Sky & Telescope magazine (Roger Sinnott & Rick Fienberg); Šaltinis: https://www.iau.org/Iau/Iau/Science/What-we-do/The-Constellations.aspx; Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licencija.

Viršelis: Žiema. VIII iš 8 paveikslų ciklo by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - 2008 - M. K. Čiurlionis National Museum of Art, Lithuania - CC BY-NC-ND; Šaltinis: https://www.europeana.eu/

Šriftas „Palemonas“, šaltinis: https://ekalba.lt/EKALBA%20Palemonas

Turinys

Turinys 3
1. Įvadas 4
2. Kometos – apžvalga 4
2.1. Etimologija 4
2.2. Fizinės savybės 5
2.2.1. Branduolys 6
2.3. Orbitos charakteristikos 9
2.3.1. Encke tipo kometos 9
3. Kometų poveikis 11
3.1. Ryšys su meteorų lietumi 11
3.2. Kometos ir gyvybės atsiradimas 12
4. Kometų kilmė ir raida 13
4.1. Oorto debesis 14
4.2. Kuiperio žiedas (diržas) 14
4.3. Išmetimas iš Saulės sistemos 14
4.4. Išnykimas 15
4.5. Suirimas ir susidūrimai 15
5. Stebėjimas mėgėjiškomis priemonėmis ir klasifikavimas 15
6. Garsios kometos 17
7. Kometų stebėjimas Lietuvoje 18
8. Santrauka 19
9. Literatūra ir šaltiniai 20

1. Įvadas

Kometos yra vieni seniausių ir dinamiškiausių Saulės sistemos kūnų. Didžiąją savo gyvavimo dalį jos praleidžia labai toli nuo Saulės kaip tamsūs, sušalę branduoliai, tačiau priartėjusios prie Saulės tampa aktyvios: iš jų paviršiaus ima veržtis dujos ir dulkės, susidaro koma bei viena ar kelios uodegos. Dėl šio virsmo kometos leidžia tiesiogiai stebėti medžiagą, iš kurios prieš maždaug 4,6 mlrd. metų formavosi planetos ir kiti Saulės sistemos kūnai.

Kometų tyrimai svarbūs ne vien astronomijai. Jų cheminė sudėtis padeda tikrinti Saulės sistemos susidarymo modelius, meteorų srautai atskleidžia kometų ir Žemės orbitų sąveiką, o organinės molekulės kometose skatina diskusijas apie vandens ir gyvybei reikalingų junginių patekimą į ankstyvąją Žemę. Kometos taip pat parodo, kaip nedideli kūnai evoliucionuoja veikiami Saulės spinduliuotės, Saulės vėjo, planetų gravitacijos ir susidūrimų.

2. Kometos – apžvalga

Kometą galima apibrėžti kaip mažą Saulės sistemos kūną, kurio branduolį sudaro lakiosios medžiagos, dulkės ir uolieninė medžiaga. Kai branduolys priartėja prie Saulės, lakiosios medžiagos sublimuoja – iš kietosios būsenos tiesiogiai pereina į dujinę. Dujos išneša dulkes, suformuoja laikiną atmosferą – komą, o Saulės spinduliuotė ir Saulės vėjas dalį medžiagos nuneša į uodegas: aktyvi kometa yra kintanti sistema, apimanti kelių kilometrų branduolį ir kartais milijonus kilometrų nusidriekusias dujų bei dulkių struktūras.

Populiarus Fredo Whipple'o pasiūlytas „purvino sniego gniūžtės“ kometos branduolio modelis pabrėžė ledo ir dulkių mišinį. Šiuolaikiniai kosminių aparatų duomenys rodo dar sudėtingesnę sandarą: branduoliai labai tamsūs, porėti, netaisyklingi, turintys dulkių plutą, lokalias aktyvias sritis, įtrūkimus ir skirtingo lakumo ledynus. Dėl to kartais vartojamas terminas „ledinis purvo luitas“ – branduolyje gali būti daug daugiau dulkių ir tuštumų, negu leidžia įsivaizduoti paprastas sniego gniūžtės palyginimas.

Kometų matomumas labai nevienodas. Dauguma jų yra silpni teleskopiniai objektai be akivaizdžios uodegos. Tik retkarčiais palanki orbita, pakankamai didelis ir aktyvus branduolys bei mažas atstumas iki Žemės lemia „didžiosios kometos“ pasirodymą.

2.1. Etimologija


Lietuviškas žodis „kometa“ per lotynų kalbą siejamas su senovės graikų žodžiu komētēs, reiškiančiu „ilgaplaukis“ arba „plaukuota žvaigždė“. Pavadinimas atsirado dėl ryškių kometų išvaizdos: jų galva ir uodega senovės stebėtojams priminė palaidus plaukus. Šis vaizdinys išliko daugelyje Europos kalbų ir atspindi regimąjį, o ne fizikinį objekto apibūdinimą.

Iki XVI a. pabaigos kometos dažnai laikytos atmosferos reiškiniais. Tycho Brahe, nagrinėdamas 1577 m. kometos paralaksą, parodė, kad ji yra daug toliau už Mėnulį. XVII–XVIII a. dangaus mechanikos raida leido nustatyti kometų orbitas, o Edmondo Halley prognozuotas 1758–1759 m. kometos sugrįžimas patvirtino, kad bent dalis kometų periodiškai skrieja aplink Saulę.


2.2. Fizinės savybės

Aktyvios kometos sandarą sudaro branduolys, koma, sąveikos su Saulės vėju sritis ir uodegos. Šių dalių masteliai labai skirtingi: branduolys dažniausiai yra kelių kilometrų dydžio, koma gali siekti šimtus tūkstančių ar daugiau kaip milijoną kilometrų, o uodegos – dešimtis ar net šimtus milijonų kilometrų. Nepaisant įspūdingo dydžio, koma ir uodegos yra nepaprastai retos; didžioji kometos masės dalis sutelkta branduolyje.

A.



B.



1 pav. Kometos struktūra. *Šaltinis: A. NASA[1], PD; B. Šaltinis: ESA[2]; CC BY-SA IGO 3.0*

[1] https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter1-3/

[2] https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2023/11/Structure_of_a_comet

2.2.1. Branduolys

Branduolys yra nuolatinė kietoji kometos dalis. Jame aptinkama vandens ledo, anglies dioksido, anglies monoksido, metano, amoniako ir kitų lakiųjų medžiagų, sumaišytų su silikatinėmis dulkėmis, mineralais ir organiniais junginiais. Nors atskirų kometų sudėtis skiriasi, bendra savybė – labai mažas atspindžio koeficientas. Daugelio branduolių albedas siekia tik kelis procentus, todėl jų paviršiai tamsesni už anglį ir efektyviai sugeria Saulės spinduliuotę.

Kosminių misijų vaizdai parodė, kad branduoliai yra netaisyklingi. 1P/Halley branduolys primena pailgą žemės riešutą; 67P/Čuriumovo–Gerasimenko kometa turi dvi ryškias skiltis, sujungtas siauresniu „kaklu“; 9P/Tempel 1 paviršiuje matyti lygumų, įdubų ir skardžių. Tokias formas lemia silpna savoji gravitacija, porėta sandara, galimas atskirų kūnų susijungimas ir ilgalaikė erozija.

Branduolio tankis paprastai mažesnis už vandens tankį. Tai reiškia, kad jo viduje gausu porų ir tuštumų, o medžiaga yra menkai sutvirtinta. Maža gravitacija leidžia dujoms ir dulkėms lengvai pabėgti. Aktyvumas dažniausiai sutelktas ne visame paviršiuje, o atskirose srityse. Branduoliui sukantis, apšviestos aktyvios sritys įsijungia, o patekusios į šešėlį susilpnėja; dėl to komoje gali susidaryti spiralių, vėduoklių ir apvalkalų.

1 lentelė. Kometos branduolio savybės.

Savybė	Tipinė reikšmė / požymis	Reikšmė
Dydis	nuo šimtų metrų iki kelių ar keliolikos kilometrų	lemia galimą aktyvumą ir ilgaamžiškumą
Albedas	dažnai apie 0,02–0,07	paviršius sugeria daug Saulės energijos
Tankis	dažnai apie 0,3–0,6 g/cm³	rodo didelį porėtumą ir silpną sandarą
Sudėtis	ledai, silikatai, dulkės, organiniai junginiai	išsaugo ankstyvosios Saulės sistemos medžiagą
Aktyvumas	lokalios čiurkšlės ir dujų išsiveržimai	keičia komą, sukimąsi ir net orbitą

2.2.2. Koma

Koma – tai aplink branduolį susidaranti dujų ir dulkių atmosfera. Ji ima ryškėti, kai Saulės šiluma suaktyvina lakiųjų medžiagų sublimaciją. Vandens ledas ypač intensyviai sublimuoja kometai priartėjus iki kelių astronominių vienetų nuo Saulės, tačiau anglies monoksidas ir anglies dioksidas gali palaikyti aktyvumą ir daug didesniu atstumu. Todėl kai kurios kometos komą suformuoja dar už Jupiterio orbitos

Koma neturi aiškaus krašto. Dujoms ir dulkėms tolstant nuo branduolio jų tankis palaipsniui mažėja. Stebint mėgėjišku teleskopu koma gali atrodyti apvali, ovali, vėduoklės ar parabolės formos. Jos centre matomas ryškesnis centrinis sutankėjimas, tačiau tai nėra pats kietasis branduolys: dėl mažo dydžio ir ryškios aplinkinės medžiagos branduolio nuo Žemės paprastai tiesiogiai nematyti.

Saulės ultravioletinė spinduliuotė ardo pirmines molekules. Pavyzdžiui, vandens molekulės skyla į vandenilio ir hidroksilo fragmentus, o aplink komą gali susidaryti milžiniškas, ultravioletiniuose bangų ilgiuose aptinkamas vandenilio gaubtas. Komos spektre taip pat stebimos CN, C_2, C_3, NH_2, OH ir kitos emisijosi. Žalsvą kai kurių kometų komos atspalvį dažniausiai sustiprina dviatomės anglies emisija, tačiau plika akimi spalva dažnai būna sunkiai pastebima.

2.2.3. Smūginė (lanko) banga

Smūginė, ”kilio” arba lanko banga (angl. bow shock). Ji susijusi su Saulės vėjo ir kometos aplinkos sąveika. Saulės vėjas – iš Saulės sklindantis įelektrintų dalelių srautas. Priartėjęs prie aktyvios kometos jis susiduria su jonizuotomis komos dujomis, yra sulėtinamas, nukreipiamas ir gali suformuoti smūginę pereinamąją sritį.

Ši struktūra nėra kietas paviršius ir jos negalima lyginti su banga vandenyje. Tai plazmos parametrų – tankio, greičio, temperatūros ir magnetinio lauko – staigaus pokyčio sritis. Jos padėtis ir forma kinta priklausomai nuo kometos dujų išsiskyrimo intensyvumo bei Saulės vėjo būsenos. Silpnai aktyvioms kometoms klasikinė smūginė banga gali būti neaiški arba pakeista platesne sąveikos zona.

2.2.4. Uodega

Kometos uodega susidaro tik aktyvumo metu. Ji visada orientuota apytikriai nuo Saulės, todėl tolstanti nuo Saulės kometa juda tarsi „uodega pirmyn“. Dažniausiai išskiriamos dvi pagrindinės uodegos: dulkių ir jonų. Kai kurioms kometoms aptikta papildomų struktūrų, pavyzdžiui, natrio uodega, o dėl geometrinės perspektyvos kartais matoma į Saulę nukreipta tariamoji priešinga uodega – antiuodega.

Jonų, arba plazmos, uodega dažniausiai yra tiesesnė ir neretai melsva. Saulės ultravioletinė spinduliuotė jonizuoja komos molekules, o Saulės vėjo magnetinis laukas įelektrintas daleles nuneša nuo Saulės. Saulės vėjo pokyčiai sukelia mazgus, vingius ir uodegos atsiskyrimo reiškinius. Persitvarkius tarpplanetiniam magnetiniam laukui sena jonų uodegos dalis gali atsiskirti, o prie komos pradėti formuotis nauja.


Dulkių uodega paprastai yra gelsva ar balkšva, platesnė ir išlinkusi. Dulkių grūdeliai atspindi Saulės šviesą. Jų trajektoriją lemia pradinio išmetimo greitis, Saulės gravitacija, spinduliuotės slėgis

ir dalelės dydis. Smulkesnes daleles spinduliuotės slėgis nukreipia stipriau, o stambesnės ilgiau išlieka arti kometos orbitos. Todėl dulkių uodega dažnai rodo sudėtingą vėduoklės, juostų ar sinchronų struktūrą.

2.2.5. Dulkių ir dujų čiurkšlės

Dulkių ir dujų čiurkšlės kyla iš aktyvių branduolio plotų. Sublimuojančios dujos veržiasi per porėtą paviršių, plyšius ar angas ir kartu išneša dulkes. Čiurkšlių stiprumas priklauso nuo medžiagos lakumo, apšvietimo kampo, vietos reljefo, šiluminio laidumo ir branduolio sukimosi. Kadangi aktyvios sritys periodiškai atsisuka į Saulę, srautai gali pulsuoti ir komoje sukurti spiralines struktūras.

Šie srautai veikia ne tik kometos išvaizdą. Pagal Niutono trečiąjį dėsnį medžiagai išlekant viena kryptimi branduolys gauna mažą priešingos krypties impulsą – vadinamąją reaktyvinę arba negravitacinę jėgą. Ilgainiui ji gali pakeisti kometos sukimosi periodą ir sukelti nedidelius orbitos nuokrypius. Todėl tikslioms efemeridėms nepakanka vien Saulės ir planetų gravitacijos; aktyvioms kometoms tenka įvertinti ir medžiagos išmetimo poveikį.



2 pav. Rosetta misijos Kometos 67P atvaizdas. *Šaltinis: ESA/Rosetta/NavCam – CC BY-SA IGO 3.0*

2.3. Orbitos charakteristikos

Kometų orbitos aprašomos tais pačiais dangaus mechanikos dėsniais kaip planetų orbitos, tačiau dažniausiai jos yra daug labiau ištęstos. Svarbiausi elementai – perihelio laikas ir atstumas, ekscentricitetas, orbitos polinkis, kylančio mazgo ilguma ir perihelio argumentas. Ekscentricitetas e nusako orbitos formą: e < 1 reiškia elipsę, e = 1 – idealizuotą parabolę, e > 1 – hiperbolę. Praktikoje labai ilgo periodo kometų orbitos nustatomos su paklaidomis, o planetų perturbacijos gali pakeisti jų energiją, todėl nedidelis e viršijimas virš vieneto ne visada reiškia tarpžvaigždinę kilmę.

Klasikinė riba tarp trumpo ir ilgo periodo kometų yra 200 metų. Tačiau išsamesnė klasifikacija remiasi ne vien periodu, bet ir sąveika su Jupiteriu, orbitos polinkiu bei Tisserando parametru Jupiterio atžvilgiu. Jupiterio šeimos kometos dažniausiai turi nedidelius polinkius ir kelių–keliolikos metų periodus. Halley tipo kometų periodai dažniausiai siekia dešimtis ar iki kelių šimtų metų, o jų orbitos gali būti labai pasvirusios ir retrogradinės.

2 lentelė. Kometų tipai

Grupė	Apytikris periodas	Tipinė kilmė / dinamika	Pavyzdys
Encke tipo	dažniausiai keli metai; afelis Jupiterio orbitos viduje	orbita nesiekia Jupiterio; Tisserando parametras dažnai > 3	2P/Encke
Jupiterio šeimos	dažniausiai < 20 m.	stipri Jupiterio įtaka; dažnai Kuiperio srities kilmė	67P/Čuriumovo–Gerasimenko
Halley tipo / vidutinio periodo	apie 20–200 m.; platesne prasme iki kelių šimtų	didesni polinkiai, galimos retrogradinės orbitos	1P/Halley, 109P/Swift–Tuttle
Ilgo periodo	> 200 m.	Oorto debesis; beveik izotropinės orbitos	C/1995 O1 Hale–Bopp
Tarpžvaigždinės	neperiodinės Saulės atžvilgiu	atkeliauja iš kitos žvaigždinės aplinkos	2I/Borisov, 3I/ATLAS

2.3.1. Encke tipo kometos

Encke tipo šeimai priskiriamos trumpo periodo kometos, kurių orbitos iš esmės yra Jupiterio orbitos viduje ir kurių judėjimo Jupiteris tiesiogiai nekontroliuoja taip stipriai kaip Jupiterio šeimos kometų. Geriausias pavyzdys – 2P/Encke, apskriejanti Saulę maždaug per 3,3 metų. Jos perihelis yra Merkurijaus orbitos viduje, o afelis – asteroidų juostos srityje.

Dažni priartėjimai prie Saulės lemia spartų lakiųjų medžiagų praradimą, todėl Encke tipo kometos paprastai nėra labai ryškios. 2P/Encke siejama su Tauridų meteorų kompleksu. Jos jonų uodegos atsiskyrimas 2007 m., kometai patekus į vainikinės masės išmetimo sukeltą plazmos srautą, tapo vaizdingu Saulės vėjo ir kometos sąveikos pavyzdžiu.

2.3.2. Trumpo periodo kometos

Trumpo periodo kometomis įprastai laikomos kometos, kurių periodas trumpesnis nei 200 metų, tačiau dinamikos požiūriu svarbiausia jų dalis yra Jupiterio šeimos kometos. Daugumos jų periodai trumpesni nei 20 metų, orbitos palyginti nedaug pasvirusios į ekliptiką, o afeliai yra netoli Jupiterio orbitos. Manoma, kad jų pirmtakai kilo iš transneptūninių objektų srities ir per išsklaidyto disko stadiją buvo nukreipti į vidinę Saulės sistemą.

Jupiterio artimi prasilenkimai gali sutrumpinti ar pailginti periodą, pakeisti perihelį arba visai išmesti kometą iš stebėjimams palankios orbitos. Tokios kometos daug kartų grįžta prie Saulės, todėl jų paviršiai palaipsniui netenka lengviausiai pasiekiamų lakiųjų medžiagų. Dalis tampa silpnai aktyviomis ar visai neaktyviomis ir išoriškai primena asteroidus.

2.3.3. Vidutinio periodo kometos

Terminas „vidutinio periodo kometos“ nėra vienodai standartizuotas. Šiame darbe juo patogu vadinti objektus tarp tipiškų Jupiterio šeimos ir labai ilgo periodo kometų – visų pirma Halley tipo kometas, kurių periodai apytikriai siekia 20–200 metų, o kai kuriose klasifikacijose įtraukiamos ir kelių šimtų metų kometos. Jų orbitos dažnai labai ekscentriškos, stipriai pasvirusios arba retrogradinės.

1P/Halley apskrieja Saulę maždaug per 76 metus, o 109P/Swift–Tuttle – maždaug per 133 metus. Šios kometos tik trumpą laiko dalį praleidžia netoli Saulės, todėl gali išsaugoti daugiau lakiųjų medžiagų negu dažnai sugrįžtančios Jupiterio šeimos kometos. Dinaminiai modeliai Halley tipo kometas dažnai sieja su Oorto debesimi, nors jų dabartinės orbitos jau stipriai pertvarkytos planetų.

2.3.4. Ilgo periodo kometos

Ilgo periodo kometų periodai viršija 200 metų ir gali siekti tūkstančius, šimtus tūkstančių ar net milijonus metų. Jų orbitos turi beveik visų krypčių polinkius, įskaitant retrogradines, todėl jų pasiskirstymas yra artimas izotropiniam. Tai vienas svarbiausių argumentų, kad šaltinis yra ne plokščias Kuiperio diržas, o Saulės sistemą gaubiantis sferinis Oorto debesis.

Naujai į vidinę Saulės sistemą patekusios ilgo periodo kometos gali būti labai aktyvios, tačiau jų ryškumą prognozuoti ypač sunku. Artimas prasilenkimas su Jupiteriu ar kita planeta gali pakeisti

beveik parabolinę orbitą į trumpesnio periodo elipsę arba į hiperbolinę trajektoriją. Dėl labai ilgo periodo žmonija dažnai stebi tik vieną tokios kometos pasirodymą.

2.3.5. Egzokometos

Egzokometos – kometos ar kometoms artimi lakiosiomis medžiagomis turtingi maži kūnai už Saulės sistemos ribų. Jų paprastai neįmanoma tiesiogiai nufotografuoti. Jos aptinkamos pagal laikinas, dažnai į žvaigždę krintančių garuojančių kūnų sukeltas sugerties linijas spektre arba pagal asimetriškus žvaigždės šviesio sumažėjimus tranzitų metu. Viena geriausiai ištirtų sistemų yra jauna žvaigždė Beta Pictoris, kurios aplinkoje egzokometų požymiai stebimi kelis dešimtmečius.

Egzokometos leidžia palyginti kitų planetinių sistemų mažųjų kūnų populiacijas su Saulės sistema. Jos rodo, kad lakiosiomis medžiagomis turtingi planetesimaliai ir jų migracija nėra unikalūs reiškiniai. Tyrimai taip pat padeda suprasti vandens ir organinių medžiagų pernašą į vidines planetinių sistemų dalis. Nuo egzokometų reikia skirti tarpžvaigždines kometas, kurios susiformavo prie kitų žvaigždžių, bet vėliau buvo išmestos ir praskriejo pro Saulės sistemą, kaip 2I/Borisov ir 3I/ATLAS.

3. Kometų poveikis

Kometos veikia planetinę aplinką keliais būdais. Jos sukuria meteoroidų srautus, gali susidurti su planetomis, perneša lakiąsias ir organines medžiagas, o jų dulkės prisideda prie tarpplanetinės dulkių populiacijos. Vis dėlto būtina atskirti moksliškai pagrįstą poveikį nuo istorinių baimių ir spekuliacijų. Vien kometos uodegos perėjimas per Žemę nėra pavojingas, nes uodegos medžiaga itin reta; didelę riziką galėtų kelti tik branduolio ar stambaus fragmento smūgis.

3.1. Ryšys su meteorų lietumi

Kometai aktyvėjant dulkės ir stambesnės dalelės pasklinda palei jos orbitą. Jos vadinamos meteoroidais. Kai Žemė kerta tokį srautą, dalelės dideliu greičiu patenka į atmosferą ir sukuria šviesos reiškinius – meteorus. Dėl perspektyvos jų trajektorijos atrodo sklindančios iš vieno dangaus taško – radianto. Meteorų lietaus pavadinimas paprastai siejamas su žvaigždynu, kuriame yra radiantas.

Dalelių pasiskirstymas orbitoje laikui bėgant kinta. Jaunas srautas gali būti susitelkęs netoli kometos, todėl aktyvumas sustiprėja jai neseniai praėjus perihelį. Senesnis srautas gali būti išsisklaidęs per didelę orbitos dalį, todėl lietus kartojasi kasmet. Planetų gravitacija perstumia dalelių srautus, todėl konkrečių metų aktyvumas gali skirtis arba kilti meteorų audros.

3 lentelė. Meteorų ir kometų ryšys

Meteorų lietus	Maksimumo laikotarpis	Motininis kūnas	Pastaba
Kvadrantidai	sausio pradžia	2003 EH1 (tikėtinas užgesusios kometos kūnas)	trumpas, kartais intensyvus maksimumas
Lyridai	balandžio pabaiga	C/1861 G1 Thatcher	senas ilgaperiodės kometos srautas
Eta Akvaridai	gegužės pradžia	1P/Halley	geriau matomi pietinėse platumose
Perseidai	rugpjūčio vidurys	109P/Swift–Tuttle	vienas patikimiausių kasmetinių lietų
Orionidai	spalio pabaiga	1P/Halley	antroji Halley kometos srauto sankirta
Drakonidai	spalio pradžia	21P/Giacobini–Zinner	kartais sukelia trumpas audras
Tauridai	spalis–lapkritis	2P/Encke kompleksas	lėti meteorai, santykinai daug bolidų
Leonidai	lapkričio vidurys	55P/Tempel–Tuttle	maždaug kas 33 metus galimos audros
Geminidai	gruodžio vidurys	3200 Phaethon	motininis kūnas – aktyvus asteroidas / pereinamasis objektas

3.2. Kometos ir gyvybės atsiradimas

Kometose aptikta vandens, anglies dioksido, anglies monoksido, metanolio, formaldehido ir įvairių sudėtingesnių organinių junginių. Tai rodo, kad priešbiotinės chemijos žaliavos formavosi dar iki planetų susidarymo ir galėjo būti pernešamos tarp skirtingų Saulės sistemos sričių. Stardust misijos iš 81P/Wild 2 pargabentuose mėginiuose rasta organinių medžiagų ir aukštoje temperatūroje susidariusių mineralų, liudijančių intensyvų ankstyvosios protoplanetinės medžiagos maišymąsi.


Hipotezė, kad kometos pristatė didelę dalį Žemės vandens, vertinama atsargiai. Kai kurių kometų deuterio ir vandenilio santykis skiriasi nuo Žemės vandenynų, nors kitų kometų reikšmės yra artimesnės. Dabartinis požiūris – Žemės vanduo tikriausiai atkeliavo iš kelių šaltinių, įskaitant vandeningus asteroidus ir dalį kometų. Kometos galėjo būti ypač svarbios kaip organinių molekulių, o ne viso vandens šaltinis.

Panspermijos idėja teigia, kad gyvybė ar jos užuomazgos gali būti pernešamos kosminiais kūnais. Tačiau tiesioginių įrodymų, kad gyvi organizmai į Žemę atgabenti kometomis, nėra.

Moksliškai pagrįstesnė yra „molekulinės pristatymo sistemos“ samprata: kometų smūgiai galėjo papildyti ankstyvosios Žemės aplinką vandeniu ir organiniais junginiais, kurie vėliau dalyvavo vietinėje cheminėje evoliucijoje.

4. Kometų kilmė ir raida

Kometų branduoliai susiformavo iš planetesimalių ankstyvojoje Saulės sistemoje. Milžiniškų planetų migracija ir gravitaciniai susidūrimai daugybę ledinių kūnų išsklaidė. Dalis liko transneptūninėje srityje, kita dalis buvo nublokšta į labai tolimas orbitas ir suformavo Oorto debesį, o dar kiti kūnai buvo išmesti į tarpžvaigždinę erdvę. Dabartinė kometos orbita nebūtinai tiesiogiai rodo jos pradinę susidarymo vietą – per milijardus metų ją galėjo daug kartų pakeisti planetos ir žvaigždinės perturbacijos.



3 pav. Kuiperio žiedas ir Oorto debesis. *Šaltinis: ESA[3], CC BY-SA IGO 3.0*

[3] https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2014/12/Kuiper_Belt_and_Oort_Cloud_in_context

4.1. Oorto debesis

Oorto debesis – hipotetinis, tačiau dinamiškai gerai pagrįstas ledinių kūnų telkinys, gaubiantis Saulės sistemą. Jo vidinė dalis gali prasidėti už kelių tūkstančių astronominių vienetų, o išorinė dalis tęstis iki dešimčių tūkstančių ar maždaug 100 000 astronominių vienetų. Debesis tiesiogiai nenufotografuotas, nes jo kūnai maži, tamsūs ir labai tolimi; jo egzistavimą rodo ilgo periodo kometų orbitų statistika [1, 3, 5].

Tolimuose debesies pakraščiuose Saulės gravitacija silpna, todėl praskrendančios žvaigždės ir Galaktikos potvyninės jėgos gali pakeisti kūnų orbitas. Dalis jų nukreipiama vidun ir po milijonų metų pasiekia planetų sritį. Priartėjusi kometa gali būti stebima pirmą kartą, grįžti į Oorto debesį, patekti į trumpesnę orbitą, atsitrenkti į Saulę ar planetą arba būti išmesta iš Saulės sistemos.

4.2. Kuiperio žiedas (diržas)

Kuiperio žiedas (diržas) – už Neptūno, apytikriai 30–50 astronominių vienetų nuo Saulės esanti plokščia ledinių kūnų sritis. Greta jo svarbus išsklaidytasis diskas, kurio objektų orbitos labiau ištęstos ir pasvirusios. Gravitacinė sąveika su Neptūnu gali palaipsniui nukreipti dalį šių kūnų į centaurų sritį tarp milžiniškų planetų, o vėliau – į Jupiterio šeimos kometų orbitas [1, 5].

Todėl teiginys, kad visos trumpo periodo kometos „tiesiogiai ateina iš Kuiperio diržo“, yra supaprastintas. Tikėtina evoliucijos grandinė yra kelių etapų: transneptūninis rezervuaras → išsklaidytasis diskas → kentauras[4] → Jupiterio šeimos kometa. Kiekviename etape orbita keičiasi dėl artimų prasilenkimų su planetomis.

4.3. Išmetimas iš Saulės sistemos

Artimas susitikimas su Jupiteriu ar kita milžiniška planeta gali suteikti kometai pakankamai orbitinės energijos, kad jos trajektorija taptų hiperbolinė. Tokia kometa palieka Saulės sistemą ir nebegrįžta. Išmetimas yra natūrali planetinių sistemų evoliucijos dalis ir tikriausiai svarbus tarpžvaigždinių kometų šaltinis. Kitos žvaigždės taip pat išmeta savo planetesimalius; nedidelė jų dalis gali praskrieti pro Saulės sistemą.

Skiriant iš Saulės sistemos išmestą vietinę kometą nuo tikros tarpžvaigždinės kometos svarbu tirti jos orbitą prieš stiprias planetų perturbacijas. Tik aiškiai hiperbolinė įeinanti orbita ir didelis perteklinis greitis yra patikimas tarpžvaigždinės kilmės požymis.

[4] Astronominiai kentaurai - astronomijoje kentaurai yra maži dangaus kūnai, skriejantys aplink Saulę tarp Jupiterio ir Neptūno, pasižymintys tiek asteroidų, tiek kometų savybėmis. Jie pavadinti mitologinių kentaurų vardais dėl savo hibridinio pobūdžio

4.4. Išnykimas

Kiekvieno perihelio metu kometa netenka medžiagos. Ilgainiui gali išsekti lengvai pasiekiami ledai, paviršius pasidengti šilumą izoliuojančia dulkių pluta, o aktyvios sritys užsiverti. Tuomet kometa tampa neveikli arba „užgesusi“ ir stebėjimuose gali būti palaikyta asteroidu. Ribos tarp kometų ir asteroidų nėra absoliučios: yra aktyvių asteroidų, užgesusių kometų ir pereinamųjų objektų.

Kitas išnykimo kelias – visiškas sublimacinis irimas. Maži branduoliai, ypač dažnai priartėjantys prie Saulės, gali prarasti didelę savo masės dalį ir galiausiai išsisklaidyti į dulkių srautą. Taip kometa gali išnykti kaip vientisas objektas, tačiau jos palikimas dar ilgai išlieka meteorų lietaus pavidalu.

4.5. Suirimas ir susidūrimai

Kometų branduoliai yra mechaniškai silpni, todėl gali skilti dėl šiluminio įtempio, dujų slėgio, greitėjančio sukimosi arba planetos potvyninių jėgų. D/3 Biela XIX a. pasidalijo į dvi dalis ir vėliau išnyko, o jos nuolaužos sukėlė Andromedidų meteorų lietų. 73P/Schwassmann–Wachmann 3 suskilo į daugybę fragmentų, stebėtų 1995 ir 2006 metais.

Ryškiausias planetinio susidūrimo pavyzdys – D/1993 F2 Shoemaker–Levy 9. Jupiterio potvyninės jėgos kometą suskaldė į fragmentų virtinę, o 1994 m. šie fragmentai vienas po kito įsirėžė į Jupiterio atmosferą ir paliko Žemės dydžio tamsias dėmes. Įvykis pirmą kartą leido iš anksto stebėti didelio kūno susidūrimą su planeta ir parodė, kad smūgiai tebėra vykstantis Saulės sistemos procesas.

5. Stebėjimas mėgėjiškomis priemonėmis ir klasifikavimas

Kometų stebėjimas prieinamas mėgėjams, tačiau reikalauja gero pasirengimo. Pirmiausia reikia pasirinkti realiai pasiekiamą objektą pagal efemeridę: įvertinti numatomą ryškį, aukštį virš horizonto, elongaciją nuo Saulės, Mėnulio fazę ir dangaus tamsumą. Kometų ryškio prognozės dažnai būna netikslios, todėl vertingiausios yra reguliarios, vienodu metodu atliekamos stebėjimų serijos.

Plika akimi matomos tik retos ryškios kometos. 7×50, 10×50 ar 15×70 žiūronai ypač naudingi didelėms ir išsklaidytoms komoms, nes suteikia platų regėjimo lauką. Nedidelis 80–150 mm teleskopas padeda stebėti centrinį sutankėjimą, silpnesnes kometas ir komos asimetriją, tačiau per didelis didinimas mažina paviršinį šviesį ir gali paslėpti išsklaidytas struktūras. Tamsus dangus dažnai svarbesnis už didesnę apertūrą.

Prieš stebėjimą akims reikia bent 20–30 minučių prisitaikyti prie tamsos. Naudotina silpna raudona šviesa, o žvilgsnį verta nukreipti šiek tiek į šalį nuo kometos – periferinis matymas jautresnis silpniems objektams. Kometa nuo galaktikos ar ūko atskiriama pagal judėjimą žvaigždžių atžvilgiu: per kelias valandas ar kelias naktis jos padėtis pasikeičia.

- Būtini įrašai: data ir laikas pasauliniu laiku (UT), vieta, instrumentas, didinimas, dangaus skaidrumas ir ribinis žvaigždinis ryškis.
- Padėtis: žvaigždynas arba tikslesnės ekvatorinės koordinatės; galima pažymėti naudotą žemėlapį ar programą.
- Bendras ryškis: vertinamas lyginant su panašaus ryškio žvaigždėmis ir sąmoningai defokusuojant, kad žvaigždžių vaizdas būtų panašaus kampinio dydžio kaip koma.
- Komos skersmuo: įvertinamas lanko minutėmis; naudinga pažymėti formą, spalvą ir centrinio sutankėjimo laipsnį.
- Uodega: įrašomas ilgis laipsniais ar lanko minutėmis, padėties kampas, forma, kreivumas, matomos juostos ar atsiskyrimai.
- Piešinys ar nuotrauka: turi būti pažymėtos kryptys, mastelis, laikas ir naudojama įranga.

Vizualinis komos kondensacijos laipsnis dažnai žymimas DC skale nuo 0 iki 9. DC = 0 reiškia visiškai difuzinę komą be ryškaus centro, o DC = 9 – beveik žvaigždišką centrinį sutankėjimą. Šis įvertis subjektyvus, bet vertingas, kai tas pats stebėtojas taiko vienodą metodą. Ryškio vertinimui svarbu nenaudoti per didelio didinimo, įtraukti visą komą ir pažymėti atmosferos sąlygas.

4 lentelė. Kometų žymėjimas

Žymuo	Reikšmė	Pavyzdys
P/	periodinė kometa; įrodyta arba patikimai nustatyta periodinė orbita	1P/Halley, 67P/Čuriumovo–Gerasimenko
C/	neperiodinė arba ilgo periodo kometa, neturinti numeruotos periodinės kometos statuso	C/1995 O1 Hale–Bopp
D/	dingusi, suirusi ar sunaikinta periodinė kometa	D/1993 F2 Shoemaker–Levy 9
X/	orbita negali būti patikimai apskaičiuota	istorinė kometa su nepakankamais duomenimis
A/	objektas iš pradžių palaikytas kometa, bet neturintis kometinio aktyvumo	asteroidinės prigimties objektas
I/	tarpžvaigždinis objektas	2I/Borisov, 3I/ATLAS

Šiuolaikinį žymenį sudaro prefiksas, atradimo metai, pusmėnesį žyminti raidė ir eilės numeris. Pavyzdžiui, C/1995 O1 reiškia pirmąją 1995 m. liepos antroje pusėje paskelbtą tokio tipo

kometą. Periodinei kometai, patikimai stebėtai daugiau negu per vieną sugrįžimą, suteikiamas nuolatinis numeris, pvz., 1P/Halley. Kometos dažnai pavadinamos atradėjų arba automatizuotos apžvalgos vardu. Pavadinimus ir žymenis administruoja Tarptautinės astronomų sąjungos struktūros bei Mažųjų planetų centras.

Fotografuojant kometas naudinga pradėti nuo fotoaparato su šviesiu objektyvu ir sekimo montuote. Trumpesni kadrai sumažina kometos judėjimo išplaukimą. Apdorojant galima sudėti kadrus pagal žvaigždes arba pagal kometos branduolio padėtį: pirmuoju atveju kometa gali būti išplaukusi, antruoju – žvaigždės virsta brūkšneliais. Fotometriniams matavimams būtinas kalibravimas, vienodas filtras ir aiškiai apibrėžta apertūra.

Mėgėjų stebėjimai tebėra moksliškai naudingi. Profesionalūs teleskopai negali ilgai stebėti kiekvienos kometos, o mėgėjų tinklai gali fiksuoti staigius žybsnius, fragmentaciją, uodegos atsiskyrimą ir ilgalaikę šviesio kreivę. Vertingiausi duomenys – ne pavienis gražus vaizdas, o tiksliai dokumentuota ir palyginama stebėjimų seka.

6. Garsios kometos

Kai kurios kometos tapo garsios dėl ryškumo, istorinio vaidmens, neįprastos orbitos arba kosminių misijų. Toliau pateikiami svarbiausi pavyzdžiai.

5 lentelė. Žymesnės kometos

Kometa	Kodėl svarbi	Pagrindinis faktas
1P/Halley	pirmoji kometa, kurios sugrįžimas sėkmingai prognozuotas	periodas apie 76 m.; 1986 m. ją tyrė keli kosminiai aparatai
2P/Encke	trumpiausio periodo gerai žinoma aktyvi kometa	periodas apie 3,3 m.; siejama su Tauridais
C/1995 O1 Hale–Bopp	viena įspūdingiausių XX a. pabaigos kometų	plika akimi matyta labai ilgai; turėjo dulkių, jonų ir natrio struktūras
C/1996 B2 Hyakutake	labai arti Žemės praskriejusi ryški kometa	1996 m. pasižymėjo itin ilga jonų uodega
D/1993 F2 Shoemaker–Levy 9	susidūrė su Jupiteriu	1994 m. fragmentai sukėlė didžiules atmosferos dėmes
67P/Čuriumovo–Gerasimenko	Rosetta ir Philae misijos taikinys	pirmasis ilgalaikis kometos lydėjimas ir nusileidimas ant branduolio
9P/Tempel 1	Deep Impact eksperimento taikinys	2005 m. į branduolį nukreiptas smogtuvas atidengė gilesnę medžiagą
81P/Wild 2	Stardust mėginių grąžinimo misijos taikinys	į Žemę pargabentos komos dulkių dalelės
C/2006 P1 McNaught	didžioji 2007 m. kometa	ypač ryški pietiniame danguje, turėjo plačią dryžuotą dulkių uodegą

C/2020 F3 NEOWISE	ryški XXI a. kometa Šiaurės pusrutulyje	2020 m. lengvai stebėta plika akimi ir fotografuota
2I/Borisov	pirmoji aiškiai kometinė tarpžvaigždinė viešnia	aptikta 2019 m.; sudėtis palyginta su Saulės sistemos kometomis
3I/ATLAS	trečiasis patvirtintas tarpžvaigždinis objektas	aptiktas 2025 m.; papildė kitų sistemų mažųjų kūnų tyrimus

Halley kometa išskirtinė tuo, kad istoriniuose šaltiniuose registruota daugiau kaip du tūkstantmečius. Edmondas Halley susiejo 1531, 1607 ir 1682 m. kometas ir numatė jų sugrįžimą. 1758 m. kometos atradimas patvirtino periodiškumą ir tapo dangaus mechanikos triumfu. 1986 m. Giotto ir kiti aparatai pirmą kartą iš arti parodė tamsų, čiurkšles skleidžiantį branduolį.

Hale–Bopp ir Hyakutake parodė, kad panašus regimasis ryškumas gali kilti dėl skirtingų priežasčių. Hale–Bopp buvo labai didelė ir aktyvi kometa, matoma iš didelio atstumo. Hyakutake branduolys buvo gerokai mažesnis, tačiau kometa praskriejo arti Žemės, todėl atrodė įspūdingai ir turėjo labai ilgą jonų uodegą.

67P/Čuriumovo–Gerasimenko tyrimai pakeitė kometų mokslo detalumo lygį. Rosetta daugiau kaip dvejus metus stebėjo, kaip aktyvumas didėja artėjant prie Saulės ir mažėja tolstant, o Philae 2014 m. atliko pirmą minkštą nusileidimą ant kometos branduolio. Misija atskleidė dviejų skilčių formą, sudėtingą reljefą, organinius junginius ir nevienodą aktyvumą.

7. Kometų stebėjimas Lietuvoje

Žymiausias ir produktyviausias kometų atradėjas Lietuvos istorijoje yra astronomas dr. Kazimieras Černis. Per savo karjerą jis iš viso yra atradęs ar bendraatradęs daugiau nei 25 kometas (naudodamas tiek antžeminius teleskopus, tiek kosminio kosminio aparato SOHO bei SWAN duomenis).

Pagal Tarptautinės astronomų sąjungos (IAU) taisykles, kometoms atradėjo vardas suteikiamas tik tuo atveju, kai jos atrandamos stebint vizualiai ar fotografuojant antžeminiais teleskopais nepriklausomai nuo automatizuotų paieškos sistemų. Šį vardą oficialiai nešioja 3 lietuvių astronomų atrastos kometos. Oficialios kometos, turinčios lietuvių astronomų vardus:

1. C/1980 O1 (Černis–Petrauskas). Atradėjai: Kazimieras Černis ir Jovaras Petrauskas. Atradimo data ir vieta: 1980 m. liepos 31 d., Maidanako observatorijoje (Uzbekistane). Atradimo aplinkybės: Tai buvo pirmoji nepriklausoma lietuvių atrasta kometa. Ji pastebėta 9-ojo ryškio. Kometa skrieja paraboline orbita.

2. C/1983 O1 (Černis). Atradėjas: Kazimieras Černis. Atradimo data: 1983 m. liepos 18 d. Atradimo aplinkybės: K. Černis kometą atrado vienas pats vizualiai stebėdamas dangų per teleskopą.

3. C/1990 E1 (Černis–Kiuchi–Nakamura). Atradėjai: Kazimieras Černis ir japonų astronomai Tsuruhiko Kiuchi bei Akinori Nakamura. Atradimo data: 1990 m. kovo 14 d. Atradimo aplinkybės: K. Černis kometą pastebėjo nepriklausomai nuo Japonijos astronomų beveik tuo pačiu metu, todėl kometai buvo suteiktas visų trijų atradėjų vardas.

Kiti atradimai kosminiuose projektuose - vėlesniais metais Kazimieras Černis, analizuodamas SOHO (Saulės ir heliosferos observatorijos) bei SOHO/SWAN kamera darytas nuotraukas, atrado dar per 20 kometų (pvz., C/2004 H6 SWAN). Tačiau pagal tarptautinius susitarimus kometos, atrastos naudojant šių kosminių misijų duomenis, gauna pačių misijų (SOHO arba SWAN), o ne konkrečių ieškotojų vardus.

8. Santrauka

- Kometos yra primityvūs, lakiųjų medžiagų ir dulkių turtingi kūnai, išsaugoję ankstyvosios Saulės sistemos medžiagą.
- Aktyvios kometos išvaizdą lemia kelių kilometrų branduolio sąveika su Saulės šiluma, spinduliuote, Saulės vėju ir magnetiniu lauku.
- Dulkių ir jonų uodegos susidaro dėl skirtingų dalelių fizikos, todėl jų forma, spalva ir orientacija skiriasi; abi iš esmės nukreiptos nuo Saulės.
- Orbitos periodas yra svarbi, bet ne vienintelė klasifikavimo ypatybė. Dinaminę kilmę geriau atskleidžia orbitos polinkis, Tisserando parametras ir sąveika su milžiniškomis planetomis.
- Jupiterio šeimos kometų šaltinis siejamas su transneptūnine sritimi ir išsklaidytuoju disku, o ilgo periodo kometų – su sferiniu Oorto debesimi.
- Kometų dulkės sukuria daugelį meteorų lietų. Kometos taip pat galėjo pristatyti į ankstyvąją Žemę dalį vandens ir organinių molekulių, tačiau tiesioginių kometinės panspermijos įrodymų nėra.
- Kometos evoliucionuoja: išsenka, pasidengia dulkių pluta, skyla, susiduria su kitais kūnais arba planetų gravitacijos išmetamos iš Saulės sistemos.
- Mėgėjiški stebėjimai tebėra reikšmingi, ypač registruojant ryškį, komos dydį, kondensaciją, uodegos struktūrą, žybsnius ir fragmentaciją.

Apibendrinant galima teigti, kad kometos yra ne tik įspūdingi dangaus reiškiniai, bet ir natūralios laboratorijos, jungiančios planetų formavimosi istoriją, plazmos fiziką, organinę chemiją, smūginius procesus ir stebėjimų astronomiją. Kiekviena nauja ryški kometa ar kosminė misija suteikia galimybę patikrinti, kiek universalūs yra iš anksčiau suformuoti modeliai.

9. Literatūra ir šaltiniai

1. Schmude, R. W. (2010). Comets and How to Observe Them. Springer.
2. Ridpath, I. (red.). Oxford Dictionary of Astronomy.
3. Moore, P. Atlas of the Universe.
4. Moore, P. Astronomijos žinyno skyrius „Comets“.
5. NASA Science. Comets: overview, facts and featured comets. https://science.nasa.gov/solar-system/comets/ (žiūrėta 2026-07-14).
6. Minor Planet Center / IAU. Comet designation and naming guidelines. https://docs.minorplanetcenter.net/mpc-ops-docs/designations/comet-naming-guidelines/ (žiūrėta 2026-07-14).
7. NASA. Exocomets. https://www.nasa.gov/universe/exoplanets/exocomets/ (žiūrėta 2026-07-14).
8. Kral, Q. ir kt. (2025). An Overview of Exocomets. Space Science Reviews.