LEF MODEL · KAPITEL 17

Kapitel 17: Die Streifen des Pazifiks — die Vorderwand der Birne und der Spiegelabdruck des Mondes

Auf Grundlage von Artikel 09 — The Stripes: The leading side of the pear on the floor of the Pacific (Teile A–C.4: die parallelen Breitenlinien, die zwei Knie im Westen, der Spiegelabdruck mit 1,37× und die Länge der Birne)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Warum durchziehen sechs gerade, parallele Streifen von Tausenden Kilometern Länge den Boden des Pazifiks — und laufen im Westen zusammen?

In den Karten des vertikalen Schweregradienten (VGG — Vertical Gravity Gradient) des Nordpazifiks fällt ein außergewöhnliches geometrisches System auf: **sechs gerade, scharfe und erstaunlich parallele Streifen** — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion und Clipperton —, die sich von den Küsten Nordamerikas über Tausende Kilometer nach Westen erstrecken (Clipperton allein über etwa **7 240 km**, mehr als der Erdradius!), und viele von ihnen erscheinen doppelt oder dreifach. In diesem Kapitel entdecken wir vier überraschende geometrische Phänomene, die darauf hinweisen, dass diese Streifen **die Narbe der Rückkehr der Birne** sind, der Birne, aus der der Mond geboren wurde:


1. **Parallelkreise eines gemeinsamen Äquators (A.1, B.1):** Die sechs Streifen sind nicht parallel zum heutigen Äquator, sondern parallele Breitenlinien **eines einzigen alten Äquators**, der um ≥ 10° gegen den heutigen Äquator

geneigt ist — verteilt von 33,6°N (Mendocino) bis 1,8°N (Clipperton), dazu zwei weitere südliche Streifen (6°S und 14°S).

2. **Die Basis der Birne bei Kiritimati liegt genau auf dem Äquator des Systems (B.2–B.3):** Die Insel Kiritimati (1,9°N, 157,5°W, in Artikel 3 als Basis der Birne über der Provinz niedriger Geschwindigkeit LLVP des unteren Mantels identifiziert) liegt nur **1,6°** vom Äquator der Streifen entfernt — und die Streifen verlaufen von ihr aus **nur nach Osten** (in Richtung Amerika)!

3. **Zwei „Knie" im Westen, die eine Breite von 3 360 km begrenzen (C.1–C.2):** Westlich von Kiritimati verlassen die Streifen ihren parallelen Verlauf: Der nördliche Streifen biegt nach unten ab (23,8°N, 164,9°E), der südliche nach oben (5,3°S, 173,2°E). Der Abstand zwischen den beiden Knien beträgt **3 360 km** (Bereich 3 040–3 700 km) — genau die Breite der Kontaktzone des Mondes (3 000 km) und der Kuppel darüber (3 650 km) —, und ihr Mittelpunkt (9,3°N, 169,3°E) liegt **3 760 km westlich der Basis**!

4. **Ein 1,37-fach vergrößerter Spiegelabdruck der Mondmaria in der Spitze (C.3):** Im Fußabdruck der Spitze im Westen erscheint ein vergrößertes Spiegelbild der Vorderseite des Mondes, in dem Imbrium (13,19°N, 179,04°E), Serenitatis (11,5°N, 166,3°E) und das Kontaktzentrum (8,2°N, 179,3°W) alle innerhalb des Radius der Spitze (1 680 km) liegen!



Die Breite jedes Streifens bezogen auf den Äquator des Streifensystems: Clipperton und die Basis der Birne bei Kiritimati liegen fast auf derselben Linie.

02 · AN IMAGE

Ein Bild: eine Falte in einer Tischdecke unter einem Buch, ein Siegel in Wachs und ein Baum, der auf dem Boden liegt

Vier Alltagsbilder veranschaulichen, wie eine riesige Birne, die aus der Erde wuchs und nach der Freisetzung des Mondes wieder nach innen gezogen wurde, die Streifen des Pazifiks hinterließ:

- **Ein Kind, das auf einem sich drehenden Karussell nach außen geht (die Neigung der Birne nach hinten zur nachlaufenden Seite, A.2):** Während sich die Birne aus der nach Osten rotierenden Erde streckte, brauchte das aufsteigende Material eine größere Bahngeschwindigkeit und *blieb daher zurück*, entgegen der Drehrichtung — also **nach Westen**. So erhielt die Birne zwei Wände: **die Vorderwand (Leading Side, im Osten)**, die sich in Drehrichtung dehnte, und **die Rückwand (Trailing Side, im Westen)** unter der geneigten Spitze!
- **Eine Falte in einer Tischdecke unter einem Buch (die Bildung der Streifen von unten und von den Seiten, B.5):** Als sich der Mond bei 3,873 Ga löste, „wurde der Korken gezogen“, der innere Druck in der Birne ließ nach, und die Birne wurde in die Erde zurückgezogen und aufgenommen. Die gedehnte Vorderwand wurde in Drehrichtung nach Osten verschmiert und faltete sich wie die Falten einer Tischdecke, die von den Seiten geschoben wird: Deshalb **laufen die Streifen unter den vulkanischen Rücken hindurch, ohne sie zu brechen** (anders als eine von oben gezogene Furche, die den Rücken durchschnitten hätte!), während die ungedehnte Rückwand zu einem Haufen zusammenbrach und sich zu den gewundenen Inselbögen des Westpazifiks zerknitterte (die Philippinen, die Marianen, Indonesien und der Bandabogen, B.8)!
- **Ein Gummistempel, der in weiches Wachs gedrückt wird (der Spiegelabdruck der Vorderseite des Mondes, C.3):** Von Angesicht zu Angesicht saß die Vorderseite des Mondes auf der Spitze der Birne. Wie spiegelverkehrt geschnittene Buchstaben auf einem Gummistempel oder eine Handfläche, die von innen an eine Fensterscheibe gedrückt und von außen

betrachtet wird: Norden bleibt Norden, aber **Osten und Westen tauschen** — und da die Dichte des Mondes auf der Spitze 1 300 kg/m³ gegenüber heute 3 344 kg/m³ betrug, ist jedes Maß im Abdruck $(3344/1300)^{1/3} = 1{,}37$-mal größer!

- **Ein gefällter Baum, der in voller Länge auf dem Boden liegt (die Übereinstimmung der Länge von 9 360 km mit der Länge der Birne, C.4):** Die Birne fiel nicht wie ein Baum, sondern wurde nach innen gezogen; doch die auf dem Ozeanboden verschmierte Vorderwand erstreckte sich über eine Länge, die der Länge des Birnenkörpers selbst im Moment der Ablösung gleicht!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: das Streifensystem, die zwei Knie und der Spiegelabdruck (Teile A–C.4)

Die Teile A–C.4 von Artikel 09 legen vier unabhängige geometrische Messungen vor, die die Identität der Streifen als Vorderwand der Birne und das Kniegebiet als Entstehungsort des Mondes bestätigen:

1. **Die Ordnung der Streifen relativ zum Äquator des Systems und zur Basis (A.1, B.1–B.4):** Auf einem dreidimensionalen Globus (Cesium), kalibriert an bekannten Bezugspunkten (Hawaii, der Hawaii-Emperor-Knick, das Ende des Tongagrabens und der Tiefseeberg Meiji, mit einer Genauigkeit von < 5 Pixeln), halten die sechs Streifen einen konstanten Abstand zu einem gemeinsamen Äquator: Mendocino (33,6°N), Pioneer (30,1°N), Murray (25,9°N), Molokai (20,4°N), Clarion (10,5°N) und Clipperton (1,8°N — 0,2°–0,8° von der Breite von Kiritimati, das bei 1,6°N liegt!). Südlich der Basis wurden zwei weitere Streifen identifiziert (etwa 6°S und 14°S, vermutlich Galápagos und Marquesas), die beweisen, dass die Basis der Birne (9 000–11 000 km breit) *innerhalb* der Breite der Vorderwand stand und nicht an ihrem Rand.

2. **Die Kontinuität der Streifen unter den Rücken und ihr Zusammenlaufen im Westen (B.5–B.6):** An vier getrennten Kreuzungen (nahe 36°N, 178°W, an den Line-Inseln 6°N, 159°W, an den Phoenix-Inseln 2°S, 175°W und bei 13°S,

152°W) tritt der Streifen unter den vulkanischen Rücken und setzt sich auf der anderen Seite ohne seitlichen Sprung und ohne den Rücken zu durchschneiden fort. Westlich der Rücken biegt der nördliche Streifen nach Süden und der südliche nach Norden ab, auf ein gemeinsames Konvergenzgebiet zu.

3. **Der Spiegelabdruck der Vorderseite mit × 1,37 Vergrößerung (C.3):** Nachdem der Autor eine erste direkte Lesart (bei der Nectaris 2 500 km von seinem Ort entfernt landete) durch die physikalisch richtige Spiegellesart ersetzt hatte (Tausch von Ost und West und 1,37-fache Vergrößerung, sodass der Abstand Imbrium–Serenitatis von heute 1 023 km auf dem Mond auf ~ 1 400 km wächst), legt die Verankerung von **Imbrium** bei 13,19°N, 179,04°E **Serenitatis** (11,5°N, 166,3°E) auf die Marshallkette, nur 410 km vom Zentrum der Spitze, und **das Kontaktzentrum** (8,2°N, 179,3°W) in 1 260 km Abstand — alle tief innerhalb des Radius der Spitze (1 680 km), während Nectaris (1 970 km) knapp außerhalb des Randes liegt, genau wie seine südliche Lage auf dem Mond!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: wie man den Spiegelmaßstab (1,37×) und die Länge des Birnenkörpers ohne den Mond berechnet

Die Teile C.1–C.4 von Artikel 09 zeigen, wie zwei einfache geometrische Eigenschaften — die Erhaltung der Mondmasse während seiner Verdichtung und die Lage des letzten Kontakts relativ zur Korotationslinie — ohne freie Parameter im Voraus sowohl die Größe des Spiegelabdrucks auf dem Ozeanboden als auch die Länge des gesamten Streifensystems festlegen:

1. **Der Spiegelvergrößerungsfaktor (× 1,37, §C.3):** Während der junge Mond auf der Spitze der Birne saß, war er aufgebläht und reich an Gasen und flüchtigen Stoffen, mit einer mittleren Dichte von $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ kg/m³. Seitdem verdichtete er sich auf seine heutige Dichte ($\rho_{\text{today}} = 3,344$ kg/m³, Radius 1 737 km), wobei seine Masse konstant blieb. Da das Volumen einer Kugel

umgekehrt proportional zu ihrer Dichte und der Radius proportional zur Kubikwurzel des Volumens ist, war jeder Abstand auf der Oberfläche des jungen Mondes **1,37-mal** größer als heute (und nach der zweistufigen Rechnung der Serie — ein Übergang von der Linse zur Kugel mit dem Faktor 0,83 und dann eine Schrumpfung von 1 890 auf 1 737 km — ergibt sich 1,31, eine Übereinstimmung auf wenige Prozent). So betrug der Abstand zwischen Imbrium und Serenitatis (heute 1 023 km) auf der Spitze der Birne **≈ 1 400 km**!

2. **Die Trennung der Länge des Birnenkörpers von der Länge des Mondes selbst (§C.4):** Im Moment der Ablösung (ein Erdtag von 5,77 Stunden) stand die Korotationslinie auf der Ablösebreite (22,5°) 17 287 km vom Erdmittelpunkt entfernt. Der Mondmittelpunkt (dessen Radius bei der Ablösung 1 890 km betrug) überschritt die Linie um etwa 210 km und stand bei 17 497 km. Daher:
    - 3. **Die Birne zusammen mit dem Mond als ihrer Spitze:** reichte genau bis zur Korotationslinie — ein Abstand von 17 287 − (6 602 bis 6 721) = 10 570–10 690 km von der Erdoberfläche.
    - 4. **Der Birnenkörper selbst (einschließlich des Spitzengebiets, ohne den Mond, der sich löste und ging):** endete einen Mondradius innerhalb des Mondmittelpunkts (17 497 − 1 890 = 15 607 km vom Erdmittelpunkt), also bei einer Länge von **8 890–9 000 km** von der Erdoberfläche — fast identisch mit der Länge des Streifensystems, das sich auf dem Ozeanboden vom Zentrum der Spitze bis Clipperton im Osten erstreckt (**9 360 km**)!
5. **Die Ausrichtung der Knie auf die Linien des Systems (§C.1–C.2):** Die beiden Knie sind nicht zufällig: Das nördliche Knie (23,8°N, 164,9°E) liegt genau auf der Breite des Pioneer-Streifens (30,0°N vom Äquator des Systems, gegenüber 30,1°N), und das südliche Knie (5,3°S, 173,2°E) liegt genau auf dem Äquator des Systems selbst (0,1° davon) — demselben Äquator, auf dem die Basis der Birne bei Kiritimati liegt (1,6° davon)!

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Das Verhältnis der Abstände auf der Mondoberfläche zwischen dem Spitzenstadium und heute, die Länge des auf der Erde verbliebenen Birnenkörpers und der Radius des Fußabdrucks der Spitze werden wie folgt formuliert (§C.1, §C.3–C.4):

$$\frac{L_{\text{tip}}}{L_{\text{today}}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1{,}37$$

$$L_{\text{pear body}} = (R_{\text{corot},\,22.5^\circ} + \Delta r_{\text{release}} - R_{\text{Moon,\,rel}}) - R_{\oplus} = 15\,607 - (6\,602-$$

Wobei $\Delta r_{\text{release}} \approx 210$ km der Abstand jenseits der Korotationslinie (17 287 km auf der Breite 22,5°) und $R_{\text{Moon,\,rel}} = 1,890$ km der Mondradius im Moment der Ablösung ist, ergibt sich, dass die Länge des Birnenkörpers (8 890–9 000 km) auf 4%–5% mit der Länge des Streifensystems (9 360 km) und den Bögen der Rückseite (8 100–10 300 km) übereinstimmt.

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: die Karte der Breitenlinien und die Spiegelkoordinaten auf dem Pazifikboden

Neben den scharfen Linien des Schweregradienten (VGG), die den Nordpazifik ohne seitliche Abweichung über 30° Breite durchziehen, gelten auf der Karte vier genaue geographische Anker (§A.1, §B.7, §C.3):

- **Der tiefe Anker im unteren Mantel (B.7):** Unter der Basis der Birne bei Kiritimati (1,9°N, 157,5°W) ist die unterste Schicht des Mantels in allen fünf Abstimmungsmodellen von Cottaar & Lekic (2016) seismisch langsam und liegt innerhalb der −1%-Kontur der pazifischen Provinz niedriger Geschwindigkeit (LLVP — ihr Zentrum 1 480–1 660 km südsüdwestlich der

Basis), in die das schwere, eisenreiche Material der Birne absank, als sie nach innen zurückgezogen wurde.

- **Der Spiegelabdruck im Fußabdruck der Spitze (Radius ≈ 1 680 km um 9,3°N, 169,3°E):** Drei der vier Schlüsselpunkte der Vorderseite des Mondes liegen tief im Spiegelfußabdruck — Serenitatis (410 km vom Zentrum), Imbrium (1 150 km) und das Kontaktzentrum (1 260 km) —, während Nectaris (1 970 km) gleich außerhalb des Südrandes liegt, genau wie seine Lage relativ zur Kontaktzone auf dem Mond!

Der Laborkasten: die Breiten der Streifen, der Spiegelabdruck (× 1,37) und die Längen der Birne (Artikel 09, Teile A–C.4)

Streifen / geographischer Anker	Abstand vom Äquator des Systems	Abstand nördlich der Breite der Basis (1,6°N)	Geometrische Rolle im Aufbau der Birne
1. Mendocino	**33,6°N**	**32,0° nördlich**	**Die Nordgrenze des Streifensystems**
2. Pioneer	30,1°N	28,5° nördlich	Entspricht der Breite des nördlichen Knies (30,0°N)
3. Murray	25,9°N	24,3° nördlich	Ein zentraler nördlicher Streifen
4. Molokai	20,4°N	18,8° nördlich	Ein zentraler Streifen
5. Clarion	10,5°N	8,9° nördlich	Ein südlich-zentraler Streifen
6. Clipperton	**1,8°N** (0,8° am Westende)	**0,2° nördlich** (Länge ~ 7 240 km)	**Verläuft direkt neben der Basis der Birne**
Die Basis der Birne (Kiritimati)	**1,6°N** (1,9°N, 157,5°W)	**0,0° (der Bezugspunkt)**	**Liegt auf dem Äquator der Streifen und über dem LLVP (Breite 9 000–11 000 km)**

Zwei südliche Streifen (Galápagos / Marquesas)	~ 6°S und ~ 14°S	7,6° und 15,6° südlich	Beweisen, dass die Basis innerhalb der Breite der Vorderwand stand

Objekt / Messung (Teil C)	Koordinaten auf dem Mond	Vorhergesagte Koordinaten auf der Erde (× 1,37, gespiegelt)	Abstand vom Zentrum der Spitze (9,3°N, 169,3°E)	Passung zum Fußabdruck (R ≈ 1 680 km)
Imbrium (der Lageanker)	**37,6°N, 340,0°E**	**13,19°N, 179,04°E**	**1 150 km (2 870 km von der Basis)**	**Im Fußabdruck (der Hauptdurchgang)**
Serenitatis (gespiegelt vorhergesagt)	**27,3°N, 18,4°E**	**≈ 11,5°N, 166,3°E**	**410 km (4 140 km von der Basis)**	**Tief im Fußabdruck (auf der Marshallkette)**
Das Kontaktzentrum (gespiegelt vorhergesagt)	**24,1°N, 335,2°E**	**≈ 8,2°N, 179,3°W**	**1 260 km (2 510 km von der Basis)**	**Im Fußabdruck**
Nectaris (gespiegelt vorhergesagt)	15,2°S, 35,0°E	≈ 3,1°S, 156,6°E	1 970 km (5 130 km von der Basis)	Außerhalb des Südrandes (entspricht seiner südlichen Lage auf dem Mond)

07 · NEXT

Die nächste Tür

In diesem Kapitel haben wir gesehen, wie sich die sechs parallelen Streifen des Nordpazifiks auf einen alten Äquator ausrichten, von der Basis der Birne bei Kiritimati nach Osten verlaufen und im Westen zwischen zwei 3 360 km voneinander entfernten Knien zusammenlaufen, in die das vergrößerte (× 1,37) Spiegelbild der Vorderseite des Mondes eingeprägt ist.

Kapitel 18

Das Zusammenlaufen des ganzen Pazifiks, die Spachtelrücken und die Lösung des Rätsels um das junge Alter des Bodens →

← Kapitel 16 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387