Oksapin

Okskarbazepin

Tabletka 300 mg (bo'luvchi chiziqli)

Tutqanoqqa qarshi (N03AF02), karbamazepin hosilasi



QISQACHA · **Boshlang'ich 600 mg/sut (2 ga bo'lib), terapevtik 600–2400 mg/sut. Natriy darajasi nazorat qilinadi.**

Ko'rsatmalar

- Parsial tutqanoqlar (ikkilamchi generalizatsiyali/siz) — kattalar va 6 yoshdan bolalarda mono yoki kombinatsiyada

Dozalash

- Kattalar: 600 mg/sut (8–10 mg/kg) 2 ga bo'lib; har hafta maks. +600 mg; terapevtik 600–2400 mg/sut
- Monoterapiyada 1200 mg/sut samarali; maks. 2400 mg/sut
- Bolalar 6 yoshdan: 8–10 mg/kg/sut 2 ga → ~30 mg/kg/sut, maks. 46 mg/kg/sut
- Buyrak KK<30: boshlang'ich 300 mg/sut; kuniga 2 marta, ovqatdan qat'i nazar

Mumkin emas

Okskarbazepin yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik, bosh og'riq, bosh aylanishi, diplopiya, ko'ngil aynishi, qusish, charchoq; GIPONATRIEMIYA (natriyni nazorat)

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Karbamazepin samarasi, lekin xavfsizroq; chiziqli farmakokinetika — samarali dozadan boshlash mumkin
- Karbamazepindan 1 kunda o'tkazish mumkin; mikrosomal fermentlarni deyarli induksiya qilmaydi
- Start monoterapiyada A darajali dalil; 6 yoshdan; KOK samarasini kamaytiradi (etinilestradiol ~50% gacha) — boshqa kontratsepsiya kerak

O'zingizni tekshiring

Oksapin karbamazepindan nimasi bilan farq qiladi?
Xavfsizlik profili yaxshiroq, chiziqli farmakokinetika, fermentlarni deyarli induksiya qilmaydi; karbamazepindan 1 kunda o'tkazish mumkin.

Oksapinning terapevtik doza oralig'i (kattalar)?
600–2400 mg/sut, 2 ga bo'lib; monoterapiyada odatda 1200 mg/sut.