Infeksiyalar va parazitlar

Orgil

Ornidazol 500 mg

Tabletka

Nitroimidazol, antiprotozoy va antianaerob (G01AF06)



QISQACHA · **Trixomoniaz: 1,5 g bir marta (>60 kg — 2 g). Spirt bilan disulfiramsimon reaksiya bermaydi.**

Ko'rsatmalar

- Trixomoniaz (ayol va erkak)
- Amebiaz (dizenteriya, jigar abssessi)
- Lyamblioz
- Anaerob infeksiyalar; ginekologik va yo'g'on ichak operatsiyalarida profilaktika

Dozalash

- Ovqatdan keyin
- Trixomoniaz: 3 tab bir marta kechqurun (>60 kg: 2 ertalab + 2 kechqurun) yoki 1 tab ×2, 5 kun; sherik ham
- Amebali dizenteriya: shu doza 3 kun; boshqa amebiaz: 1 tab ×2, 5–10 kun
- Lyamblioz: 3 tab (>60 kg: 4) bir marta, 1–2 kun
- Bolalar <35 kg: trixomoniaz 25 mg/kg; lyamblioz/amebiaz 40 mg/kg bir marta

Mumkin emas

> Imidazollarga sezuvchanlik; MNS kasalliklari; qon diskraziyasi

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, qusish, metall ta'mi (~3%); bosh aylanishi, uyquchanlik; kam — tremor, neyropatiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Spirt bilan disulfiramsimon reaksiya BERMAYDI — metronidazoldan asosiy farqi
- Varfarin ta'sirini kuchaytiradi; vekuroniy, litiy bilan ehtiyot

O'zingizni tekshiring

Orgilning metronidazoldan asosiy farqi?

Spirt bilan disulfiramsimon reaksiya bermaydi.

Lyambliozda Orgil dozasi (kattalar)?

3 tabletka (1,5 g) bir marta kechqurun; >60 kg — 4 tabletka; 1–2 kun.