Panash krem



Tiokolxikozid 0,25% (2,5 mg/g)

Krem 30 g

Markaziy ta'sirli miorelaksant (M03BX05)

QISQACHA · **Kuniga 2–3 marta, kurs 7–10 kun. Homiladorlik va emizishda mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Bel-dumg'aza radikuliti, servikobraxialgiya (bo'yin, yelka mushak og'rig'i, kontraktura)
- Mushak rigidligi, operatsiyadan keyingi og'riq
- O'tkir umurtqa patologiyasida og'riqli mushak kontrakturasi — yordamchi

Dozalash

- Shikastlangan joyga kuniga 2–3 marta ozgina ishqalab
- Kurs 7–10 kun
- 17 yoshgacha qo'llanmaydi

Mumkin emas

> Sezuvchanlik; periferik falaj; mushak gipotoniyasi; homiladorlik; laktatsiya; kontratsepsiya qilmayotgan tug'ish yoshidagi ayollar

Nojo'ya ta'sirlar

Toshma; kam — uyquchanlik

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Mahalliy miorelaksant — tizimli so'rilish minimal
- NYaQP (gel/tabletka) bilan kombinatsiya — og'riq + spazm
- Tutqanoq anamnezida ehtiyot

O'zingizni tekshiring

Panash kremining ta'sir etuvchi moddasi va guruhi?

Tiokolxikozid — markaziy ta'sirli miorelaksant.

Panash kimga mumkin emas?

Homilador, emizikli, kontratsepsiya qilmayotgan ayollar, periferik falaj, mushak gipotoniyasi.