Infeksiyalar va parazitlar

Polimik

Ofloksatsin 200 mg + Ornidazol 500 mg

Tabletka

Kombinatsiyalangan antibakterial (J01RA09)



QISQACHA · **1 tab kuniga 2 marta, 7–10 kun. 16 yoshgacha mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Siydik yo'llari: pielonefrit, prostatit, sistit, epididimit
- Jinsiy yo'l: gonokokk, xlamidiya, trixomonada; ginekologik infeksiyalar
- Ichak: amebiaz, lyamblioz, salmonellyoz, shigellyoz; o'tkir nekrotik yarali gingivit
- Operatsiya oldi/keyingi profilaktika

Dozalash

- Kattalar: 1 tab kuniga 2 marta, 7–10 kun
- Simptomlar ketgach yana kamida 3 kun; 2 oydan ko'p emas
- Chaynamay, suv bilan, ovqatdan oldin yoki keyin

Mumkin emas

Xinolon/komponentga sezuvchanlik; ftorxinolon bilan tendinit anamnezi; epilepsiya va tutqanoq chegarasi pasaygan holatlar; 16 yoshgacha va o'sish davridagi o'smirlar; homiladorlik va laktatsiya; G6FD tanqisligi (gemoliz xavfi)

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh aylanishi, uyqusizlik, qorin og'riq, diareya, ko'ngil aynishi, toshma; kam — QT uzayishi, tendinit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Aerob + anaerob + protozoy — aralash infeksiyalar uchun bitta tabletka
- Quyosh/UV dan saqlanish
- Antatsid, sukralfat, temir, rux — ofloksatsindan 2 soat keyin

O'zingizni tekshiring

Polimik tarkibi?

Ofloksatsin 200 mg + ornidazol 500 mg.

Polimik standart dozasi?

1 tabletka kuniga 2 marta, 7–10 kun.