Nevrologiya

Rekol

Memantin

Tabletka 10 mg (bo'luvchi chiziqli); qadoqda 20 mg shakli ham bor

Demensiyaga qarshi, NMDA retseptor antagonisti (N06DX01)



QISQACHA · **Titrlash 5 → 10 → 15 → 20 mg (har hafta), kuniga 1 marta. Amantadin, ketamin bilan birga emas.**

Ko'rsatmalar

- O'rta va og'ir darajali Altsgeymer demensiyasi

Dozalash

- Titrlash: 1-hafta 5 mg → 2-hafta 10 mg → 3-hafta 15 mg → 4-haftadan 20 mg/sut
- KUNIGA 1 MARTA, har kuni bir vaqtda; samara va o'zlashtirish 3 oy ichida baholanadi
- Buyrak KK 30–49: 10 mg (yaxshi o'zlashtirilsa 20 mg); KK 5–29: 10 mg/sut
- Og'ir jigar yetishmovchiligida tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

Memantin yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik, bosh aylanishi, muvozanat buzilishi, AQB oshishi, qabziyat, bosh og'riq; kam — chalkashlik, gallyutsinatsiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Patogenetik davo: ortiqcha glutamatdan neyronlarni himoya qiladi; erta tayinlash progressiyani sekinlatadi
- Donepezil (Servoneks) bilan kombinatsiyasi FDA tomonidan tasdiqlangan
- Kuniga 1 marta — parvarish qulay; O'zbekistondagi eng arzon memantin

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Rekol — aql-idrokni saqlab qolamiz! / intellekt aylanishini saqla!»

- Demensiyaning patogenetik davosi (NMDA blokadasi), FDA tomonidan ma'qullangan
- Parvarishlovchi kuniga 1 marta beradi — qulay
- Narxi arzon

O'zingizni tekshiring

Rekol qaysi dorilar bilan birga berilmaydi?
Boshqa NMDA antagonistlari: amantadin, ketamin, dekstrometorfan (psixoz xavfi).

Rekolning qo'llab-quvvatlovchi dozasi?
20 mg kuniga 1 marta (4-haftadan).