Rosemid ODT

Risperidon

Og'izda dispergirlanuvchi tabletka 2 mg / 4 mg, №30

Antipsixotik (N05AX08)



QISQACHA · **Shizofreniya: 2 mg, keyin 4 mg/sut. Demensiyadagi agressiya: 0,5 mg ×2, 6 haftadan ortiq emas.**

Ko'rsatmalar

- Shizofreniya
- Bipolyar buzilishda maniakal epizodlar
- O'rta va og'ir Altsgeymer demensiyasida turg'un agressiya — 6 haftagacha
- 5 yoshdan bolalar va o'smirlarda aqliy rivojlanishi past bo'lganda xulq buzilishidagi agressiya — 6 haftagacha

Dozalash

- Shizofreniya: 2 mg/sut, 2-kun 4 mg
- Mania: 2 mg kuniga 1 marta; har ≥24 soatda 1 mg ga tuzatish
- Demensiyadagi agressiya: 0,25 mg ×2 → optimal 0,5 mg ×2 (maks. 1 mg ×2), 6 haftadan ortiq emas
- Xulq buzilishi (≥50 kg): 0,5 mg ×1 → optimal 1 mg ×1

Mumkin emas

> Risperidon yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Parkinsonizm, uyquchanlik, bosh og'riq, uyqusizlik (≥10%); akatiziya (dozaga bog'liq), giperprolaktinemiya, vazn ortishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- ODT shakli: suvsiz og'izda eriydi — yutishga qiynaladigan va qabulni yashiradigan bemorlarga qulay
- Nevrolog va psixiatr uchun ko'rsatmalari bor
- Demensiya agressiyasida qisqa kurs (≤6 hafta)

O'zingizni tekshiring

Altsgeymer demensiyasidagi agressiyada Rosemid dozasi?

0,25 mg ×2 dan, optimal 0,5 mg ×2, maks. 1 mg ×2; 6 haftadan oshmaydi.

ODT shaklining afzalligi?

Og'izda suvsiz eriydi — yutish qiyin yoki qabulni yashiradigan bemorlarga qulay.