Serrata



Serratiopeptidaza

Ichakda eruvchan tabletka 10 mg; strip 30 tab (qutida 1, 5 yoki 10 strip)

Proteolitik ferment, yallig'lanishga va shishga qarshi (M09AB)

QISQACHA · 10 mg kuniga 2–3 marta ovqatdan keyin, maks. 30 mg/sut. Qon ivishi buzilishida mumkin emas.

Ko'rsatmalar

- Jarrohlikdan keyingi shish (tish olish, suyak sinishi, plastik jarrohlik)
- Nafas yo'llari: balg'amni suyultiradi; LOR: burun bo'shlig'i sekreti
- Teri: o'tkir yallig'lanish dermatozlari; gematomalar, sut bezlari kattalashuvi

Dozalash

- Kattalar: 1 tab kuniga 2–3 marta ovqatdan keyin
- Chaynamay, bir stakan suv bilan
- Maks. 30 mg/sut

Mumkin emas

O'ta sezuvchanlik; qon ivishi buzilishi

Nojo'ya ta'sirlar

Diareya, ko'ngil aynishi, qusish, anoreksiya, epigastral noqulaylik; kam — toshma

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Antibiotiklarning yallig'langan to'qimaga kirishini kuchaytiradi
- Antikoagulyantlar ta'sirini kuchaytiradi — ehtiyot
- Bolalar va homiladorlarga tavsiya etilmaydi

O'zingizni tekshiring

Serrata antibiotiklar bilan qanday ishlaydi?

Antibiotiklarning yallig'lanish o'chog'iga kirishini tezlashtiradi.

Serratada asosiy QMBH?

Qon ivishining buzilishi va o'ta sezuvchanlik.