Servoneks

Donepezil

Tabletka 5 mg / 10 mg

Atsetilxolinesteraza ingibitori (N06DA02)



QISQACHA · **5 mg kechqurun, kamida 1 oydan keyin 10 mg. Bradikardiya xavfi.**

Ko'rsatmalar

- Yengil va o'rtacha og'ir Altsgeymer demensiyasi (simptomatik davo); SPV: aralash va tomir demensiyasida ham samarali

Dozalash

- 5 mg kuniga 1 marta KECHQURUN, uxlashdan oldin
- Kamida 1 oydan keyin 10 mg gacha; maks. 10 mg/sut
- Buyrak — tuzatish shart emas; 18 yoshgacha tavsiya etilmaydi
- Davolashni demensiya bo'yicha tajribali vrach boshlaydi; parvarishlovchi bo'lishi kerak

Mumkin emas

Donepezil yoki piperidin hosilalariga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Diareya, ko'ngil aynishi, bosh og'riq, uyqusizlik, mushak tortishishi, BRADIKARDIYA; kam — SA/AV blokada, GI qon ketish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- 1/3 bemorda yaxshilanish, 2/3 da stabilizatsiya; parvarish yukini va neyroleptik ehtiyojini kamaytiradi
- T½ ≈ 70 soat — kuniga 1 marta
- Rekol bilan kombinatsiya (tez progressiyalanuvchi demensiyada)

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Servoneks — intellekt involyutsiyasini to'xtat!»

- Altsgeymer va tomir demensiyasida samarali — aralash shakllarda dorilar soni kamayadi
- Parvarish muassasasiga yotqizishni kechiktiradi, neyroleptik ehtiyojini kamaytiradi
- Kuniga 1 marta

O'zingizni tekshiring

Servoneks qachon qabul qilinadi?
Kechqurun, uxlashdan oldin, kuniga 1 marta.

Servoneksda yurakka oid asosiy ehtiyot?
Bradikardiya va SA/AV blokada xavfi — sinus tugun zaifligi bo'lsa ehtiyot.