Gastroenterologiya

Sogelen

Mesalazin 1000 mg

Rektal suppozitoriy

Aminosalitsilat (A07EC02)



QISQACHA · **1 g sham kuniga 1 marta kechqurun (yarali proktit).**

Ko'rsatmalar

- To'g'ri ichak bilan chegaralangan yengil va o'rta og'ir o'tkir yarali kolit (yarali proktit)

Dozalash

- 1 supp (1 g) kuniga 1 marta rektal, kechqurun uxlashdan oldin
- Muntazam qo'llash; davomiyligi vrach belgilaydi

Mumkin emas

Salitsilatlarga sezuvchanlik; og'ir jigar yoki buyrak buzilishi

Nojo'ya ta'sirlar

Kam (~3%): bosh og'riq, qorin og'riq, diareya, ko'ngil aynishi; juda kam — perikardit, pankreatit, nefrit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Mahalliy ta'sir yallig'lanish o'chog'ida
- Qon, jigar, kreatinin, siydik tahlili — oldin va davomida
- Azatioprin, 6-merkaptopurin bilan miyelosupressiya xavfi

O'zingizni tekshiring

Sogelenning ko'rsatmasi?

To'g'ri ichak bilan chegaralangan yengil-o'rta o'tkir yarali kolit (proktit).

Sogelen qachon yuboriladi?

Kuniga 1 marta kechqurun, uxlashdan oldin.