Suprileks

Izoksuprin 10 mg

Tabletka

Periferik vazodilatator, beta-adrenomimetik, tokolitik (C04AA01)



QISQACHA · **Muddatidan oldin tug'ish xavfi: 20 mg kuniga 4 marta, 2 kun. Qon aylanishi buzilishi: 10–20 mg 3–4 marta.**

Ko'rsatmalar

- Muddatidan oldin tug'ish xavfi (in'eksion davodan keyin)
- Periferik qon aylanishi buzilishi: arteriospazm, oblitlovchi endarteriit, diabetik angiopatiya, Reyno
- Surunkali serebrovaskulyar yetishmovchilik (aterosklerotik)

Dozalash

- Tug'ish xavfi: v/i davodan keyin 20 mg kuniga 4 marta, 2 sutka
- Qon aylanishi: 10–20 mg kuniga 3–4 marta ovqatdan keyin, 2–3 oy

Mumkin emas

> Sezuvchanlik; yaqinda serebral qon ketish, metrorragiya, arterial qon ketish; stenokardiya; gipotenziya; laktatsiya

Nojo'ya ta'sirlar

Taxikardiya, yurak urishi, gipotenziya, ko'krak og'rig'i, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi; homilada taxikardiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ortostatik gipotenziya — asta turish
- Chekish samarani kamaytiradi; alkogol mumkin emas
- Homiladorlikda faqat muddatidan oldin tug'ish xavfida

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Suprileks — qon aylanishini yaxshilash uchun O'zbekistonda yagona periferik vazodilatator»

- Shifokorlar: xirurg, revmatolog, endokrinolog

O'zingizni tekshiring

Muddatidan oldin tug'ish xavfida Suprileks sxemasi?
In'eksion davodan keyin 20 mg kuniga 4 marta, 2 sutka.

Suprileksning asosiy nojo'ya ta'siri?
Taxikardiya va gipotenziya (ona va homilada).