Infeksiyalar va parazitlar

Taygeron

Levofloksatsin

Tabletka 500 / 750 mg; infuziya 500 mg/100 ml

Ftorxinolon (J01MA12)





QISQACHA · 500 yoki 750 mg kuniga 1 marta. 18 yoshgacha mumkin emas.

Ko'rsatmalar

- O'tkir bakterial sinusit; surunkali bronxit qaytalanishi; shifoxonadan tashqari pnevmoniya
- Siydik yo'llarining asoratli infeksiyalari, pielonefrit; surunkali bakterial prostatit
- Teri va yumshoq to'qima asoratli infeksiyalari; ingalyatsion kuydirgi

Dozalash

- Pnevmoniya: 500 mg 1–2 marta 7–14 kun yoki 750 mg 5 kun
- Sinusit: 500 mg 10–14 kun yoki 750 mg 5 kun
- Siydik yo'llari: 500 mg 7–14 kun yoki 750 mg 5 kun; prostatit: 500 mg 28 kun
- Antatsid, temir, rux, sukralfat — 2 soat oraliq; KK<50 da dozani kamaytirish
- Infuziya og'ir holatda, keyin tabletkaga o'tish

Mumkin emas

Sezuvchanlik; epilepsiya; ftorxinolonlar bilan pay shikastlanishi anamnezi; 18 yoshgacha; homiladorlik va emizish

Nojo'ya ta'sirlar

Uyqusizlik, bosh og'riq, ko'ngil aynishi, diareya; kam — tendinit/pay uzilishi, QT uzayishi, gipoglikemiya, neyropatiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- "Respirator" ftorxinolon: pnevmoniyada keng spektr
- Keksalarda va KS qabul qiluvchilarda pay jarohati xavfi
- Quyoshdan saqlanish

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Taygeron — keng chiqarilish shakllariga ega arzon levofloksatsin»

- Shifokorlar: onkolog, pulmonolog, urolog, xirurg, LOR

O'zingizni tekshiring

Taygeron qaysi preparatlardan 2 soat oraliq bilan ichiladi?
Antatsidlar (Mg, Al), temir, rux, sukralfat, didanozin.

Surunkali bakterial prostatitda Taygeron kursi?
500 mg kuniga 1 marta, 28 kun.