Ukrliv

Ursodezoksixol kislota 250 mg

Tabletka

Gepatoprotektor, o't toshini erituvchi (A05AA02)



QISQACHA · **~10 mg/kg kechqurun, 6–24 oy. Faqat xolesterin (rentgen-negativ) toshlar.**

Ko'rsatmalar

- Diametri ≤15 mm rentgen-negativ xolesterin toshlarini eritish (o't pufagi funksiyasi saqlangan)
- Dekompensatsiyalanmagan birlamchi biliar sirroz
- 6 yoshdan mukovistsidozdagi gepatobiliar kasalliklar

Dozalash

- Tosh eritish: ~10 mg/kg KECHQURUN: <60 kg 2 tab; 61–80 kg 3; 81–100 kg 4; >100 kg 5 tab
- Kurs 6–24 oy; 12 oyda kichraymasa to'xtatish; har 6 oyda UZI
- Birlamchi biliar sirroz: 14±2 mg/kg/sut
- Mukovistsidoz: 20 mg/kg/sut 2–3 ga bo'lib (30 mg/kg gacha)

Mumkin emas

Sezuvchanlik; o't pufagi/yo'llarining o'tkir yallig'lanishi; o't yo'llari obstruksiyasi; tez-tez biliar kolika; o't pufagi qisqarishi buzilishi; rentgen-kontrast kalsiylashgan toshlar; dekompensatsiyalangan sirroz; bolalarda muvaffaqiyatsiz portoenterostomiya/o't yo'li atreziyasi

Nojo'ya ta'sirlar

Bo'tqasimon axlat, diareya, o'ng qovurg'a ostida og'riq; tosh kalsiylashishi; sirroz dekompensatsiyasi; eshakemi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Faqat XOLESTERIN (rentgen-negativ) toshlarni eritadi
- Xolestiramin, kolestipol, Al-antatsidlar, smektit — 2 soat oraliq; siklosporin so'rilishini oshiradi, siprofloksatsinnikini kamaytiradi
- Nazorat: AST, ALT, GGT dastlabki 3 oy har 4 haftada; toshda 6–10 oyda UZI

O'zingizni tekshiring

Ukrliv qanday toshlarni eritadi?

Diametri 15 mm gacha bo'lgan rentgen-negativ xolesterin toshlarini.

Tosh eritishda Ukrliv qachon ichiladi?

Kechqurun uxlashdan oldin, kuniga 1 marta (~10 mg/kg).