Nevrologiya

Vertineks

Proxlorperazin

Tabletka 5 mg

Fenotiazin neyroleptik, qusishga qarshi (N05AB04)



QISQACHA · **Menyer/vertigo: 5 mg ×3. Qusish: 20 mg, kerak bo'lsa 2 soatdan keyin 10 mg.**

Ko'rsatmalar

- Menyer sindromi, labirintit va boshqa sabablardan bosh aylanishi
- Har qanday sababli ko'ngil aynishi va qusish (migren bilan bog'liq ham)
- Shizofreniya, o'tkir mania, xavotirni qisqa muddat boshqarish — yordamchi

Dozalash

- Ko'ngil aynishi profilaktikasi: 5–10 mg kuniga 2–3 marta
- Ko'ngil aynishi/qusish davosi: 20 mg bir marta, kerak bo'lsa 2 soatdan keyin 10 mg
- Vertigo/Menyer: 5 mg ×3, kerak bo'lsa 30 mg/sut gacha; keyin 5–10 mg/sut gacha kamaytirish
- Xavotir: 15–20 mg/sut, maks. 40 mg; 12 yoshgacha tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

Proxlorperazin yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik, og'iz qurishi, o'tkir distoniya (yoshlarda), akatiziya, parkinsonizm, giperprolaktinemiya, gipotenziya, QT uzayishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Vestibulyar bosh aylanishi va qusishni bir dori bilan yopadi
- Gipotenziyada adrenalin ishlatilmaydi
- Keksalarga past doza

O'zingizni tekshiring

Menyer sindromida Vertineks dozasi?

5 mg kuniga 3 marta, kerak bo'lsa 30 mg/sut gacha; keyin 5–10 mg/sut gacha kamaytiriladi.

Vertineksning yoshlarda tez-tez uchraydigan nojo'ya ta'siri?

O'tkir distoniya (okulogir kriz) — odatda davolashning dastlabki 4 kunida.