Vidanol

Traneksam kislota 500 mg

Tabletka

Antifibrinolitik, gemostatik (B02AA02)



QISQACHA · **Menorragiya: 1 g kuniga 3 marta, 4 kungacha. Tromboz va tromboemboliyada mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Menorragiya (ko'p hayz qon ketishi)
- Giperfibrinoliz bilan qon ketishlar: prostata operatsiyasi, gematuriya, burun qonashi, gifema, bachadon bo'yni konizatsiyasi, tonzillektomiya
- Gemofiliyada tish olish; irsiy angionevrotik shish

Dozalash

- Menorragiya: 1 g kuniga 3 marta, 4 kungacha (maks. 4 g/sut), hayz boshlanganda
- Mahalliy fibrinoliz: 1–1,5 g 2–3 marta, 3–15 kun
- Burun qonashi: 1 g ×3, 7 kun; konizatsiya: 1,5 g ×3, 12 kungacha
- Gemofiliyada tish olish: 25 mg/kg har 8 soatda (1 kun oldin boshlab)
- Buyrak buzilishida dozani kamaytirish

Mumkin emas

> Og'ir buyrak yetishmovchiligi; yuqori siydik yo'llaridan makroskopik gematuriya; tromboemboliya; o'tkir vena/arterial tromboz

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, qusish, diareya, toshma, bosh aylanishi; kam — tromboemboliya, rang ko'rish buzilishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ginekolog, LOR, urolog, stomatolog uchun
- Ko'rish buzilsa — oftalmologik tekshiruv
- 12 yoshdan bolalarda 20–25 mg/kg

O'zingizni tekshiring

Menorragiyada Vidanol dozasi?

1 g kuniga 3 marta, 4 kungacha; maks. 4 g/sut.

Vidanol qaysi gematuriyada mumkin emas?

Yuqori siydik yo'llaridan makroskopik gematuriyada (laxta bilan obstruksiya xavfi).