Volvit

Biotin 5 mg

Tabletka, №30

Vitamin B7 (A11HA05)



QISQACHA · **5 mg kuniga 1 marta, 12 yoshdan. Laboratoriya tahlillariga ta'sir qilishi mumkin.**

Ko'rsatmalar

- Biotin tanqisligi: soch (to'kilish, mo'rtlik), teri (dermatit, seboreya), tirnoq (mo'rtlik, qatlamlanish)
- Malabsorbsiya, biotinidaza yetishmovchiligi
- Psixoemotsional buzilishlar (holsizlik, asabiylik) — tanqislik fonida

Dozalash

- 12 yoshdan: 5 mg kuniga 1 marta ovqatdan oldin
- Malabsorbsiya — 10 mg/sut gacha; tanqislik — 5–20 mg/sut
- Kurs o'rtacha 1 oy

Mumkin emas

Sezuvchanlik; 12 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Juda kam: allergik reaksiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- LABORATORIYA TESTLARINI BUZADI (troponin, gormonlar) — tahlildan oldin vrachga aytish
- Valproat biotin darajasini pasaytiradi; xom tuxum oqi so'rilishni kamaytiradi
- Retseptsiz

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Volvit — soch, tirnoq va teri muammolarini hal qiladi!»

- Biotinning davolovchi dozasi — fermentlarning faol shakllarini hosil qiladi

O'zingizni tekshiring

Volvit qabul qilayotgan bemorga tahlil bo'yicha nima aytish kerak?

Biotin troponin va gormon tahlillarini buzishi mumkin — laboratoriya/vrachni ogohlantirish.

Volvit dozasi?

5 mg kuniga 1 marta, 12 yoshdan.