Zardeks

Gabapentin

Kapsula 300 mg

Tutqanoqqa qarshi, nevropatik og'riqqa qarshi (N03AX12)



QISQACHA · **Titrlash: 1-kun 300 mg ×1, 2-kun ×2, 3-kun ×3; maks. 3600 mg/sut. Doza buyrak funksiyasiga qarab.**

Ko'rsatmalar

- Epilepsiya: parsial tutqanoqlar (6 yoshdan qo'shimcha, 12 yoshdan monoterapiya)
- Kattalarda periferik nevropatik og'riq (diabetik neyropatiya, postgerpetik nevralgiya)

Dozalash

- Titrlash: 1-kun 300 mg ×1, 2-kun 300 mg ×2, 3-kun 300 mg ×3 (900 mg/sut)
- Keyin har 2–3 kunda +300 mg; maks. 3600 mg/sut, 3 ga bo'lib (oraliq 12 soatdan ko'p emas)
- Bolalar 6+: 10–15 mg/kg/sut dan → 25–35 mg/kg/sut
- Buyrak KK: 50–79 → 600–1800; 30–49 → 300–900; 15–29 → 150–600 mg/sut
- To'xtatish kamida 1 hafta davomida asta

Mumkin emas

Gabapentinga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik, bosh aylanishi, ataksiya, holsizlik, isitma, ko'ngil aynishi, diareya; kam — o'tkir pankreatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Nevropatik og'riqda va epilepsiyada — ikki yo'nalish
- Ovqat bilan yoki ovqatsiz, yetarli suv bilan
- Opioidlar bilan nafas depressiyasi xavfi — ehtiyot

O'zingizni tekshiring

Zardeks titrlashining birinchi 3 kuni?

1-kun 300 mg ×1, 2-kun 300 mg ×2, 3-kun 300 mg ×3.

Zardeks dozasi nimaga qarab tuzatiladi?

Buyrak funksiyasiga (kreatinin klirensi) qarab.