Infeksiyalar va parazitlar

Ziomitsin

Azitromitsin

Tabletka 250 mg / 500 mg

Makrolid (azalid) antibiotik (J01FA10)



QISQACHA · **Odatda 500 mg kuniga 1 marta, 3 kun. Xlamidiyada 1 g bir marta.**

Ko'rsatmalar

- LOR: sinusit, faringit, tonzillit, otit
- Nafas yo'llari: o'tkir bronxit, pnevmoniya
- Teri va yumshoq to'qima: Laym (ko'chib yuruvchi eritema), saramas, impetigo, akne
- Xlamidiya uretriti/servitsiti; H. pylori bilan bog'liq yara

Dozalash

- Ovqatdan 1 soat oldin yoki 2 soat keyin, kuniga 1 marta
- LOR/nafas/teri: 500 mg ×1, 3 kun
- Xlamidiya: 1 g BIR MARTA
- Laym: 1-kun 1 g, 2–5 kun 500 mg; H. pylori: 1 g 3 kun
- Bolalar 25–50 kg: 10 mg/kg, 3 kun

Mumkin emas

Azitromitsin, makrolidlar yoki komponentga o'ta sezuvchanlik; og'ir jigar va buyrak yetishmovchiligi

Nojo'ya ta'sirlar

Diareya (juda tez-tez), qusish, qorin og'riq, ko'ngil aynishi, bosh og'riq; kam — QT uzayishi, gepatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- To'qimada plazmadan ~50 marta yuqori, T½ 2–4 kun — qisqa kurs
- Akne: 6 g kurs (3 kun 500 mg, keyin haftasiga 500 mg 9 hafta)
- Antatsidlar bilan bir vaqtda emas; ergot alkaloidlari bilan tavsiya etilmaydi; digoksin va kolxitsin darajasi oshishi mumkin

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Ziomitsin — barcha kuch uchta tabletkada!»

O'zingizni tekshiring

Ziomitsin qachon ichiladi?

Ovqatdan 1 soat oldin yoki 2 soat keyin, kuniga 1 marta.

Xlamidiyada Ziomitsin dozasi?

1 g bir marta.