Gastroenterologiya

Zolopent

Pantoprazol 40 mg

Ichakda eruvchan tabletka

Proton pompasi ingibitori (A02BC02)



QISQACHA · **40 mg ovqatdan 1 soat oldin. H. pylori: 40 mg ×2 + ikki antibiotik, 7 kun.**

Ko'rsatmalar

- Reflyuks-ezofagit (kattalar va 12 yoshdan)
- Me'da va o'n ikki barmoq ichak yarasi
- H. pylori eradikatsiyasi (antibiotiklar bilan)
- Zollinger-Ellison sindromi

Dozalash

- Ovqatdan 1 soat oldin, chaynamay
- Reflyuks-ezofagit: 40 mg/sut 4 hafta (+4); me'da yarasi: 40 mg 4–8 hafta; 12-barmoq: 40 mg 2–4 hafta
- H. pylori (7 kun): 40 mg ×2 + amoksitsillin 1 g ×2 + klaritromitsin 500 mg ×2 (yoki metronidazol bilan)
- Zollinger-Ellison: 80 mg/sut dan; og'ir jigar — maks. 20 mg/sut

Mumkin emas

Pantoprazol, benzimidazol hosilalari yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Tez-tez: me'da tubi bez poliplari (xavfsiz); tez-tez emas: diareya, ko'ngil aynishi, qusish, qorin shishi, qabziyat, og'iz qurishi, qorin og'riq, bosh og'riq, bosh aylanishi, uyqu buzilishi, jigar fermentlari oshishi, toshma; noma'lum: gipomagniemiya; suyak sinishi xavfi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Buyrak buzilishida doza o'zgarmaydi
- Atazanavir bilan birga tavsiya etilmaydi; varfarin bilan XNN nazorati; yuqori dozali metotreksat bilan ehtiyot
- Ziomitsin yoki Orgil bilan eradikatsiya sxemalarida o'rin bor

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Zolopent — Kontrolokka 98,5% bioekvivalent pantoprazol / Me'da shirasi kislotaligini me'yorda ushla!»

O'zingizni tekshiring

Zolopent qachon ichiladi?
Ovqatdan 1 soat oldin, chaynamasdan.

Reflyuks-ezofagitda Zolopent kursi?
40 mg/sut 4 hafta, kerak bo'lsa yana 4 hafta.