Nevrologiya

Zoresan

Zonisamid

Qattiq jelatin kapsula 25 / 50 / 100 mg, №30 (3×10)

Tutqanoqqa qarshi (N03AX15). Na- va T-tipli Ca-kanallarni bloklaydi



QISQACHA · Monoterapiya: 100 mg/sut dan → 300 mg/sut, kuniga 1 marta. Sulfonamid allergiyasida mumkin emas.

Ko'rsatmalar

- Epilepsiya: yangi tashxislangan kattalarda parsial tutqanoqlar (ikkilamchi generalizatsiyali/siz) — monoterapiya
- Parsial tutqanoqlar — qo'shimcha terapiya: kattalar va 6 yoshdan bolalar
- Parkinson kasalligining harakat simptomlari, levodopaga qo'shimcha (off-label, pasport bo'yicha)

Dozalash

- Monoterapiya (kattalar): 100 mg ×1 → har 2 haftada +100 mg; qo'llab-quvvatlovchi 300 mg/sut, maks. 500 mg
- Qo'shimcha, CYP3A4 induktorlari bilan (karbamazepin va b.): 1-hafta 50 mg/sut (2 ga), 2-hafta 100 mg, keyin har hafta +100 mg → 300–500 mg/sut
- Induktorlarsiz yoki buyrak/jigar buzilishida: titrlash har 2 haftada → 300–500 mg/sut
- Bolalar 6 yoshdan (≥20 kg): 1 mg/kg/sut dan, har hafta +1 mg/kg → 6–8 mg/kg/sut (maks. 500 mg)
- Kuniga 1 marta (T½ ≈ 60 soat), ovqatdan qat'i nazar

Mumkin emas

Zonisamid, yordamchi moddalar yoki SULFONAMIDLARGA o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik, bosh aylanishi, anoreksiya, vazn kamayishi, xotira buzilishi, buyrak toshi, metabolik atsidoz, depressiya; bolalarda terlash kamayishi va qizib ketish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Biokiraolishligi ~100%, ovqatga bog'liq emas; kuniga 1 marta — qulay
- ILAE (2013): fokal tutqanoqlar monoterapiyasida A darajali dalil
- Kombinatsiya: Mezakar, Oksapin, Logufen, Lanistor bilan (boshlang'ich 50 mg 2 ga bo'lib); Parkinsonda Konfundus + Zoresan 25 mg

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Zoresan — epilepsiyali bemorlar uchun umid uchquni»

- Ko'p komponentli ta'sir mexanizmi; neyroprotektor xossalar
- Parkinsonda levodopaga qo'shimcha: "o'chib qolish" davrini qisqartiradi

O'zingizni tekshiring

Zoresan kimga mumkin emas?
Zonisamid va sulfonamidlarga o'ta sezuvchanlikda.

Zoresan ichayotgan bolaga nimani aytish kerak?
Issiqda qizib ketmaslik, og'ir jismoniy yuklamadan saqlanish, ko'p suv ichish; topiramat/atsetazolamid va antixolinergiklar bilan birga bermaslik.