Кванил® - нейропротекция ва тикланиш

КВАНИЛ (цитиколин) – кучли далиллар базасига эга нейропротектор, органик/ишемик бош мия шикастланишлари фонида ўткир даврда ҳам, ремиссия даврида ҳам жуда самарали. Реабилитация даврида Кванилни қабул қилиш давомли асоратларнинг ривожланиш хавфиникамайтиради, миянинг органик/ишемик шикастланишлари бўлган беморларда когнитив (ақлий) кўрсаткичларни яхшилайди, деменсли беморларда кайфиятни яхшилайди.

Муҳим маълумотлар:

- **Ўткир ва ўртача оғирликдаги ишемик инсультда дастлабки 24 соатда перорал буюрилган цитиколин 3 ой ичида тўлиқ тикланиш эҳтимолини оширади;**
- **Кванил ўткир даврдаги каби, реабилитация даврида ҳам самарали.**
- **Кванил инсультдан ва бош мия жароҳатларидан кейинги неврологик бузилишларни тиклашга ёрдам беради.**

Хоссаси	Устунлиги	Фойдаси
Нейропротектор таъсир	Шикастланиш ўчоғида келгусида юзага келадиган нейронлар нобуд бўлиши олдини олади ва уларнинг тикланишига ёрдам беради.	Анча тўлиқ ва тез тикланишга ёрдам беради.
Ўткир даврда ҳамда реабилитация босқичларидаги исботланган самарадорлик	Даволаш схемасини тубдан ўзгартириш эҳтиёжи йўқ.	Мижозни самарали даволаш.
Нейронлар апоптози ингибитори	Шикастланиш ўчоғида бўлган нейронлар ўлимининг олдини олади	Мижознинг реабилитацияси хавфсизлигига ва тўлиқ бўлишига ҳисса қўшади.
Юқори хавфсизлик профили	Ўзлаштирилиши яхши.	Асоратлар хавфи минимал даражада.
Инъекция ва таблетка шакллари мавжуд	Босқичли даволаш имконияти	Қўллаш учун қулай
Кванил препарати субстанцияси Японияда ишлаб чиқарилади	Препаратнинг юқори сифати	Даволашда кафолатланган самара

РЕКОЛ: АҚЛ-ИДРОКНИ сақлаб қоламиз!

Рекол (мемантин) деменцияни (енгилдан бошлаб оғир шаклларигача) даволаш учун асосий препаратлардан бири., Альцгеймер ва бошқа дement ҳолатларда бўлган мижозларнинг когнитив кўрсаткичларини яхшилаган ҳолда, ортиқча глутаматнинг салбий таъсирларини бартараф этади.

Муҳим маълумотлар:

РЕКОЛ препаратини ўз вақтида тайинланиши когнитив функцияларни сезиларли тарзда яхшиланиш имконини беради.

РЕКОЛ мижозларнинг кундалик фаолликларини ошириш ва ушлаб туришга ёрдам беради, уларнинг умумий ҳиссий ҳолатини яхшилайди.

Хоссаси	Устуворлиги	Фойдаси
NMDA- рецепторни блоклайди	Деменцияни патогенетик терапияси	Натижаларга ишонч
FDA томонидан деменцияни даволаш учун маъқулланган.	Даволаш халқаро даво протоколлари (баённомаси)га мувофиқ келади.	Деменцияси бўлган мижозларни даволашда юқори самарадорлик
Ярим чиқарилиш даври узоқ	Препарат парваришловчи томонидан куннинг биринчи ярмида бир марта берилади	Дement мижозларни парвариш қилишда қулай
Препарат нархи арзон	Даволаш кенг доирадаги мижозлар учун мос келади	Турли ижтимоий гуруҳдаги мижозлар учун кафолатланган ёрдам

Зоресан – ЭПИЛЕПСИЯСИ (ТУТҚАНОҚ) БЎЛГАН МИЖОЗЛАР УЧУН УМИД УЧҚУНИ

Зоресан Ўзбекистон бозорида эпилепсияга қарши янги препарат. Зоресан кўп компонентли таъсир механизмига эга.

Муҳим маълумотлар:

Кўп компонентли таъсир механизми

ILAE тавсияларида А тоифадаги далилий даража

хоссаси	усутворлиги	фойдаси

2013 й.даги Халқаро эпилепсияга қарши лига (ILAE) томонидан Зонисамидга ҳозирда катталардаги фокал хуружларнинг монотерапияси сифатида самарадорлиги бўйича А тоифасидаги далилий даража берилган.	Халқаро тавсияларга амал қилиш, даволашнинг муваффақияти ва самарадорлигига ишонч	Эпилепсиянинг фокал хуружларини самарали ва синовдан ўтган давоси.
Эркин радикаллар таъсрига қарши ҳимоя хусусиятларига эга.	Тажрибада такрорланувчи хуружлар натижасида нейронларнинг нобуд бўлишининг олдини олади	Нейропротектор хусусиятлар.
Биокираолиши тахминан 100 %га етади, овқат истеъмолига боғлиқ эмас	Тезкор самара, препаратнинг сўрилишига овқат таъсир қилмайди	Овқатланишга боғлиқ бўлмаган ҳолда, қабул қилиш мумкин
Ярим чиқарилиш даври чамаси 60 соат	Суткада бир марта қабул қилиш имкониятини беради	Қўллашда қулай
Деводопга қўшимча сифатида, Паркинсон касаллигининг ҳаракат аломатларини даволашда ҳам қўллаш мумкин.	Паркинсон касаллиги бўлган мижозлар терапиясида, уларнинг ҳаракат фаоллигини ва ҳаёт сифатини кўтаришда леводопни оптималлаштириш.	“Ўчиб қолиш” даври давомийлигини қисқартириш – Паркинсон касаллиги бўлганларда янада кўпроқ ҳаракатчанлик, ҳаёт сифатини яхшилаш.

МЕЗАКАР – импульслар устидан тўлиқ назорат!

Муҳим маълумотлар:

Мезакар (карбамазепин) – эпилепсияни даволашда биринчи қатор препарат!

хоссаси	устуворлиги	фойдаси
Яхши ўрганилган молекула	Шифокор ишонч билан Мезакарни буюриши мумкин	Давонинг самарадорлигига ишонч.
Юқори технологик ишланма	Сифатли генерик маҳсулот	Давонинг самарадорлигига ишонч
Препарат арзон нархларда	Мижозларнинг кенг доираси даволана олади	Турли ижтимоий гуруҳдаги мижозларга кафолатли ёрдам
Нейронларнинг такрорий таъсирланиш кучи зўрайишининг юқори частотасини сақлаш қобилиятини пасайтиради	Ғайриихтиёрий разрядлар тарқалишини камайтиради.	Эпилепсия хуружларининг кучайиш частотаси камайиб боради.
Қадоқда 50 та таблетка	Қадоғи узоқ муддатга етади	Мижоз учун фойдали ва арзон
Карбамазепин оғриқ қолдирувчи таъсирга эга	Нейропатияни патогенетик даволаш	Нейропатияда оғриқни бартараф этади

Логуфен – тўлқин кучини назоратинга ол!

Муҳим маълумотлар:

Нейропротектив хоссаларга эга антиэпилептик препарат.

Когнитив функцияларни яхшиловчи антиэпилептик препарат

ХОССАСИ	УСТУВОРЛИГИ	ФОЙДАСИ
Леветирацетам ноёб таъсир механизмига эга - SV2A транспорт оқсилини блоклайди	Эпилепсиянинг барча асосий шаклларида ва эпилептик тутқаноқларда, ҳаттоки бошқа барча ЭҚП самарасиз бўлган ҳолларда поли- ва монотерапия сифатида кенг қўллаш доирасига эга.	Эпилепсиянинг асосий шакллари ва эпилептик хуружлар турларидан қатъи назар, ҳар қандай мижозга тайинлаш мумкин. Такрор ташхисланган эпилепсияни эмпирик даволаш имконияти.
Энг юқори концентрация чўққисига эришиш вақти – 1,3 соат.	Терапевтик концентрацияни қонда тез намоён бўлиши	Даволашнинг биринчи кунидан самара беради
Перорал қўлланганда юқори биокираолиши юқори (чамаси 100%)	Сўрилиш даражаси овқат қабул қилишга боғлиқ бўлмайди.	Қўллашда қулай

Буюрилганда дозани титрлаш талаб қилинмайди	Самарали терапевтик дозадан қўллашни бошлаш мумкин.	Шифокор ва мижоз учун қулайлик
Ярим чиқарилиш даври чамаси 8 соат	Бир кунда 2 марта қабул қилиш буюрилади	Мижоз учун қулайлик

Ланистор – қийинчиликларни енгишда энг оддий йўл!

Ланистор (ламотриджин) – эпилептик фаолликни бостиришнинг селектив механизмига эга универсал антиэпилептик препарат, қабул қилишнинг мақбуллиги ва когнитив функцияларга “эҳтиёткорона” муносабатда бўлиш хоссаларига эга.

Антидепрессив хоссаларга эга тимолептик, исталган турдаги БАБни даволашда нафақат терапевтик, балки профилактик самарага ҳам эга.

Муҳим маълумотлар:

Нормотимик таъсирга эга антиэпилептик препарат (кайфиятни кўтаради)

хоссаси	**устуворлиги**	**фойдаси**
Икки ҳисса селектив таъсир механизми	Суст инактивация фазасида нейронларнинг пресинаптик мембранасининг потенциал боғлиқ Na каналларини блоклайди ва ортиқча миқдорда глутамат ажралиб чиқишини тўсади ҳамда нейромедиаторларнинг табиий балансини ушлаб туради.	Эпилепсиянинг барча асосий шаклларида ва эпилептик хуружларнинг турларида кенг қўлланилади.
Нейрон фаоллигига эзувчи таъсир кўрсатмайди	Когнитив функцияларга рағбатлантирувчи таъсир кўрсатади (хуружлардан кейинги давр давомийлигини ва субклиник разрядлар частотасини пасайтиради)	Нейропротектор хоссалари. Диққатни, фаолликни яхшилайди, кайфиятни барқарорлаштиради.
Ярим чиқарилиши	Препаратни суткада бир марта қабул	Қўллашда қулай

даври 29 соат	қилиш имконини беради	
Ўз метаболизмини қўзғатмайди (глюкуронилтрансферераза фаоллигини оширмайди).	Узоқ вақт қабул қилганда қабул қилиш бошидагидек концентрацияда қолади.	Дозани тўғрилаш талаб этилмайди.
Нормотимик – кайфиятни яхшилайди	Депрессив фаза (депрессия)ни самарали бостиради	БИПОЛЯР АФФЕКТИВ БУЗИЛИШ профилактикасида самарали ва хавфсиз
Гепотоксиклик ва кардиотоксиклиги мавжуд эмас	Кардиометаболик хавфни оширмайди, тромбоцитлар фаоллиги ва қон қуюлишига (бошқа вальпроатларда мавжуд бўлган), дигар ферментлари фаоллигига таъсир кўрсатмайди	Катта ва кекса ёшли беморларда эпилепсияни даволашда биринчи рақамли танлов препарати саналади.