Двойной селективный механизм действия	Блокирует потенциалзависимые Na каналы пресинаптических мембран нейронов в фазе медленной инактивации и угнетает избыточное высвобождение глутамата, поддерживает естественный балланс нейромедиаторов.	Широкий спектр применения при всех основных формах эпилепсий и типах эпилептических припадков.
Не оказывает угнетающего влияния на нейрональную активность	Оказывает стимулирующее действие на когнитивные функции (снижает продолжительность постприступного периода и частоту субклинических разрядов)	Нейропротекторные свойства. Улучшение внимания, активности, выравнивание настроения.
Период полувыведения около 29 часов	Позволяет принимать препарат один раз в сутки	Удобство в применении
Не индуцирует свой собственный метаболизм (не повышает активность глюкуронилтрансферазы).	При длительном приеме концентрация остается такой же, как и в начале приема.	Не требуется коррекции дозы.
Подвергается глюкуронизации, а не окислительному метаболизму с участием ферментов цитохрома Р450	Не влияет на уровень естественных или экзогенных половых гормонов и не снижает эффективности комбинированных оральных контрацептивов (КОК)	Лечение эпилепсии у женщин детородного возраста, в том числе принимающих пероральные контрацептивы
Большой объём данных исследования, в котором принимали участие более 8700 женщин, получавших монотерапию ламотриджином в I триместре беременности, не свидетельствовали о зачительном увеличении риска возникновения основных врожденных пороков развития, включая пороки развития ротовой полости. Исследования на животных продемонстрировали тератогенную токсичность.	Не вызывает дефектов развития нервной трубки, как вальпроаты и карбамазепин, не повышает риска развития у ребенка аутизма, не вызывает выкидышей на ранних стадиях, как вальпроаты, так как неявляется сильным антагонистом фолатов	Возможно применение при беременности
Нормотимик – улучшает настроение	Эффективно подавляет депрессивную фазу (депрессию)	Эффективен и безопасен в профилактике при БИПОЛЯРНОМ АФФЕКТИВНОМ РАССТРОЙСТВОЕ
Отсутствие гепатотоксичности и кардиотоксичности	Не повышает кардиометаболический рис, не влияет на активность тромбоцитов и свертываемость крови (которое есть у вальпроатов), активность ферментов печени	Препаратом первого выбора при лечении эпилепсии у больных пожилого и старческого возраста.