Паспорт препарата ПРАМИСУМ



0,25 мг и 1 мг

1. **Состав (действующее вещество), форма выпуска, дозы:** 1 таблетка содержит прамипексола дигидрохлорида моногидрата 0,25 мг, что соответствует 0,18 мг прамипексола или прамипексола дигидрохлорида моногидрата 1,0 мг, что соответствует 0,7 мг прамипексола
2. **Фармакотерапевтическая группа:** Противопаркинсонические препараты. Допаминэргические средства. Агонисты допамина. Код АТХ N04B C05
3. **ПРАМИСУМ** - мощный агонист дофаминовых рецепторов, для лечения любой стадии болезни паркинсона: в качестве монотерапии на ранних стадиях заболевания или в комбинации с леводопой на более поздней стадии.
4. **Целевая группа врачей и показания**:

№	Специальность	Показания	Форма выпуска и доза препарата
	Паркинсонологи	Лечение признаков и симптомов идиопатической болезни Паркинсона у взрослых до 50 лет в качестве монотерапии (без леводопы) или в комбинации с леводопой в течение заболевания до поздних стадий, когда эффект леводопы снижается или становится неустойчивым и возникает колебания терапевтического эффекта (феномен «включения-выключения»).	ПРАМИСУМ 0,25 мг №30 ПРАМИСУМ 1,0 мг №30
	Неврологи взрослые	Лечение признаков и симптомов идиопатической болезни Паркинсона у взрослых в качестве монотерапии (без леводопы) или в комбинации с леводопой в течение прогрессирования заболевания до поздних стадий, когда эффект	ПРАМИСУМ 0,25 мг №30 ПРАМИСУМ 1,0 мг №30

		леводопы снижается или становится неустойчивым и возникает колебания терапевтического эффекта (феномен «включения-выключения»). Симптоматическое лечение идиопатического синдрома беспокойных ног от умеренной до тяжелой степени у взрослых, дозы не выше 0,75 мг (в виде прамипексола дигидрохлорида).	

1.
2. **<u>Основные схемы лечения:</u>**

Болезнь Паркинсона.

Суточную дозу распределять на 3 приема.

Начальное лечение.

Как показано ниже, дозу прамипексола необходимо увеличивать постепенно, с начальной дозы 0,375 мг каждые 5-7 дней. Если у пациентов не возникает непереносимых побочных явлениях дозу необходимо титровать до достижения максимального терапевтического эффекта

Неделя терапии	Режим дозирования	Суточная доза
1	3 х 0,125	0,375
2	3 х 0,25	0,75
3	3 х 0,5	1,5

При необходимости дальнейшего увеличения дозы суточную дозу нужно увеличивать на 0,75 мг еженедельно до максимальной 4,5 мг в сутки. Однако следует отметить, что частота возникновения сонливости повышается при применении доз 1,5 мг в сутки (см. Раздел «Побочные реакции»).

Поддерживающая терапия.

Индивидуальная доза колеблется от 0,375 мг до максимальной 4,5 мг в сутки. При увеличении дозы эффект лечения наблюдали, начиная с суточной дозы 1,5 мг. Дальнейшая корректировка дозы нужно осуществлять, учитывая клиническую ответ и возникновения побочных реакций. При прогрессирующей болезни Паркинсона назначения дозы выше 1,5 мг может быть целесообразным для пациентов, для которых планируется уменьшение дозы леводопы (при комбинированной терапии с леводопой). Рекомендуется снижение дозы леводопы в случае увеличения дозы прамипексола и при поддерживающей терапии в зависимости от реакции каждого отдельного пациента (см. Раздел

«Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Прекращение лечения.

Внезапное прекращение допаминергической терапии может привести к развитию злокачественного нейролептического синдрома или к синдрому отмены агонистов допамина. Дозу прамипексола следует снижать постепенно, на 0,75 мг в сутки, к снижению суточной дозы до 0,75 мг. После этого дозу следует снижать на 0,375 мг в сутки. Во время постепенного снижения дозы может возникнуть синдром отмены агонистов допамина. В таком случае может понадобиться временное увеличение дозы препарата с последующим возвращением к его постепенной отмены.

Синдром беспокойных ног.

Рекомендованная начальная доза прамипексола составляет 0,125 мг 1 раз в сутки за 2-3 часа до сна. Для пациентов, которые нуждаются в дополнительном облегчения симптомов, дозу можно увеличивать каждые 4-7 дней до максимальной 0,75 мг в сутки

Возможные комбинации с другими препаратами Кусум

№	Возможная комбинация	Показание	Примечание
1	Конфундус + Прамисум 0,25 мг (1,0 мг)	Комбинация с леводопой в течение заболевания до поздних стадий, когда эффект леводопы снижается или становится неустойчивым и возникает колебания терапевтического эффекта (феномен «включения-выключения»).	При добавлении препарата Прамисум к Конфундусу возможно будет необходимость снизить дозировку леодопы.
2	Конфундус + Прамипексол 0,25 мг (1,0 мг)+ Рекол 10 (20) мг	Терапия деменции на фоне болезни Паркинсона	
3	Конфундус + Прамисум 0,25 мг (1,0 мг) + Нейрокобал 500 мкг	Комплексная терапия болезни Паркинсона	Гипергомоцистеинемия является частым метаболическим осложнением болезни Паркинсона - повышенный уровень гомоцистеина является дополнительным

			фактором риска формирования когнитивных нарушений у таких пациентов

Противопоказания к назначению препарата:

Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому другому компоненту препарата

1. **Основные побочные эффекты и частота их возникновения**

Большинство побочных реакций обычно наблюдается в начале терапии, значительная часть их исчезает, даже если терапия продолжается.

Болезнь Паркинсона.

У пациентов с болезнью Паркинсона при лечении прамипексолом сравнению с плацебо частыми побочными реакциями (≥ 5%) были тошнота, дискинезия, артериальная гипотензия, головокружение, сонливость, бессонница, запор, галлюцинации, головная боль и утомляемость. Частота возникновения сонливости повышалась при применении доз 1,5 мг в сутки. Наиболее частой побочной реакцией при приеме в комбинации с леводопой была дискинезия. Артериальная гипотензия может возникнуть в начале лечения, особенно если прамипексол титруется слишком быстро.

Психические расстройства: бессонница, галлюцинации, нарушение сна, спутанность сознания, симптомы расстройства контроля над побуждением и компульсивное поведение.

Нечасто: патологическое влечение к посещению магазинов, патологическое влечение к азартным играм, беспокойство, гиперсексуальность, бред, расстройства либидо, паранойя, делирий, переедание, гиперфагия.

Редкие: мания.

Со стороны нервной системы. Очень часто: сонливость, головокружение, дискинезия. Часто: головная боль. Нечасто: внезапное нападение сна, амнезия, гиперкинезия, обмороки.

Синдром беспокойных ног.

У пациентов с синдромом беспокойных ног при лечении прамипексолом частыми побочными реакциями (≥ 5%) были тошнота, головная боль, головокружение и повышенная утомляемость. Тошнота и повышенная утомляемость чаще наблюдались у женщин (20,8% и 10,5% соответственно) по сравнению с мужчинами (6,7% и 7,3% соответственно) при лечении прамипексолом.

2. **СПВ по препарату:**

СВОЙСТВО	ПРЕИМУЩЕСТВО	ВЫГОДА
Прамисум Агонист рецепторов дофамина	Прямая стимуляция постсинаптических ДА рецепторов.	Эффективность на всех стадиях болезни Паркинсона.
Улучшает чувствительность постсинаптических рецепторов к дофанину	Способствует замедлению прогрессирования заболевания.	Отодвигает время перехода пациента на леводопу.
Эффективность Прамипексола на ранних стадиях Болезни Паркинсона почти сопоставима с препаратами леводопы	Применяется для монотерапии на начальной стадии Болезни Паркинсона.	Улучшается качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона.