Паспорт препарата Росемид ОДТ



1. **Состав (действующее вещество), форма выпуска, дозы:** Каждая таблетка содержит рисперидона 2 мг или 4 мг;
2. **Фармакотерапевтическая группа:** Антипсихотическое средство. Прочие нейролептики. **Код АТХ: N05AX08**

Целевая группа врачей и показания:

№	Специальность	Показания	Форма выпуска и доза препарата
1	Неврологи	- Для краткосрочного лечения (до 6 недель) стойкой агрессии у пациентов с умеренной и тяжелой деменцией Альцгеймера - Для краткосрочного симптоматического лечения (до 6 недель) стойкой агрессии при расстройстве поведения у детей в возрасте от 5 лет и подростков с интеллектуальным развитием ниже среднего или с умственной отсталостью	Росемид 2, 4 мг № 30
2	Психиатры	- Шизофрения - Маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве - Для краткосрочного лечения (до 6 недель) стойкой агрессии у пациентов с умеренной и тяжелой деменцией Альцгеймера - Для краткосрочного симптоматического лечения (до 6 недель) стойкой агрессии при расстройстве поведения у детей в возрасте от 5 лет и подростков с интеллектуальным развитием ниже среднего или с умственной отсталостью	Росемид 2, 4 мг № 30

1. Основные схемы лечения:

№	Показание согласно инструкции*	Длительность терапии	Доза и кратность приема
1	Шизофрения	Некоторым пациентам может потребоваться более медленная фаза титрования и более низкие начальная и поддерживающая доза.	Пациентам следует начинать с рисперидона в дозе 2 мг / сут. На второй день дозу можно увеличить до 4 мг.
2	Маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве		Таблетки, диспергируемые в полости рта, Росемид® следует принимать один раз в день, начиная с 2 мг рисперидона. Корректировка дозы, если указано, должна производиться с интервалами не менее 24 часов и с шагом 1 мг в день.
3	*Стойкая агрессия у пациентов с умеренной и тяжелой деменцией Альцгеймера*	не следует применять более 6 недель у пациентов с устойчивой агрессией при деменции Альцгеймера.	Рекомендуется начальная доза 0,25 мг два раза в день. Эта дозировка может быть индивидуально скорректирована с шагом 0,25 мг два раза в день, при необходимости не чаще, чем через день. Оптимальная доза для большинства пациентов составляет 0,5 мг два раза в день. Однако некоторым пациентам подходят дозы до 1 мг два раза в день.
4	*Расстройства поведения Дети и подростки от 5 до 18 лет*		Для субъектов ≥ 50 кг рекомендуется начальная доза 0,5 мг один раз в день. При необходимости эту дозу можно индивидуально скорректировать с шагом 0,5 мг один раз в день, но не чаще, чем через день. Оптимальная доза для большинства пациентов составляет 1 мг один раз в сутки.

2. Противопоказания к назначению препарата: Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата.

3. **Основные побочные эффекты и частота их возникновения:**

Наиболее частые побочные реакции (частота ≥ 10%) включают: паркинсонизм, седативный эффект / сонливость, головная боль и бессонница.

Среди побочных эффектов, которые оказались дозозависимыми, были паркинсонизм и акатизия.

В каждой группе частоты побочные эффекты представлены в порядке уменьшения серьезности.

Инфекции и инвазии:

Часто: пневмония, бронхит, инфекция верхних дыхательных путей, синусит, инфекция мочевыводящих путей, инфекция уха, грипп.

Нечасто: инфекция дыхательных путей, цистит, инфекция глаза, тонзиллит, онихомикоз, инфекция подкожной клетчатки, вирусная инфекция, акародерматит.

Редко: инфекция

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы

Нечасто: нейтропения, снижение количества лейкоцитов, тромбоцитопения, анемия, снижение гематокрита, повышение количества эозинофилов.

Редко: агранулоцитоз

Нарушения со стороны иммунной системы

Нечасто: гиперчувствительность

Редко: анафилактическая реакция

Эндокринные нарушения

Часто: гиперпролактинемияа

Редко: нарушение секреции антидиуретического гормона, присутствие глюкозы в моче.

Нарушение метаболизма и питания

Часто: увеличение веса, повышенный аппетит, пониженный аппетит

Нечасто: сахарный диабет, гипергликемия, полидипсия, уменьшение веса, анорексия, повышение уровня холестерина в крови.

Редко: водная интоксикация, гипогликемия, гиперинсулинемия, повышение уровня триглицеридов в крови.

Очень редко: диабетический кетоацидоз

Психические расстройства

Очень часто: бессонница

Часто: расстройство сна, ажитация, депрессия, тревожность

Нечасто: мания, состояние спутанности сознания, снижение либидо, нервозность, ночные кошмары

Редко; притупленный аффект, аноргазмия

Нарушения со стороны нервной системы

Очень часто: седативный эффект/ сонливость, паркинсонизм, головная боль

Часто: акатизия, дистония, головокружение, дискинезия, тремор

Нечасто: поздняя дискинезия, церебральная ишемия, отсутствие реакции на раздражители, потеря сознания, подавленный уровень сознания, судороги, синкопе, психомоторная гиперактивность, нарушение равновесия, нарушение

координации, постуральное головокружение, нарушение внимания, дизартрия, нарушение внимания, дизартрия, гипестезия, парестезия.
Редко: злокачественный нейролептический синдром, цереброваскулярное расстройство, диабетическая кома, титубация головы.

4. **Основные конкуренты**

№	Торговое название, форма выпуска, дозировки	Действующее вещество	Производитель	Примечание
1	RESPONGIL FILM C.TABS 2MG 20	Рисперидон	SPEY MEDICAL GB UNITED KINGDOM	
2	RISPAXOL FILM C.TABS 2MG 60	Рисперидон	GRINDEX LATVIA	
3	SEDAREX C.TAB 2MG 30	Рисперидон	GM PHARMACEUTICALS GEORGIA	

Ключевое сообщение: Яркие возможности диспергированной формы.

5. СПВ

Свойство	Преимущество	Выгода
Росемид ОДТ растворяется в полости рта	Препарат будет эффективным даже у пациентов с проблемами глотания	Росемид ОДТ позволит стабилизировать состояние большего количества пациентов с шизофренией и аутизмом
Росемид ОДТ доступнее, чем большинство других препаратов рисперидона	Большее количество пациентов смогут позволить себе качественное лечение	Росемид ОДТ позволит стабилизировать состояние большего количества пациентов с шизофренией и аутизмом
Приятный мятный вкус	Отличается от других препаратов содержащих рисперидон	Повышается комплаенс пациентов