Паспорт препарата Флутисал 20 мг



1. **Состав (действующее вещество), форма выпуска, дозы:** 1 твердая капсула содержит флуоксетина гидрохлорид в пересчете на флуоксетин 20 мг.
2. **Фармакотерапевтическая группа:** Средства для лечения заболеваний нервной системы. Психоаналептики. Антидепрессанты. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Флуоксетин.
3. Код АТХ: N06AB03
4. **Целевая группа врачей и показания**:

№	Специальность	Показания	Форма выпуска и доза препарата
1	Семейные врачи	Обсессивно-компульсивное расстройство. Булимический невроз	Флутисал 20 мг № 30
2	Неврологи	Большие депрессивные эпизоды. Обсессивно-компульсивное расстройство. Булимический невроз	Флутисал 20 мг № 30
3	Психиатры	Большие депрессивные эпизоды.	Флутисал 20 мг № 30

		Обсессивно-компульсивное расстройство. Булимический невроз	

1. Основные схемы лечения:

№	Показание согласно инструкции*	Длительность терапии	Доза и кратность приема
1	Большой депрессивный эпизод.	У пациентов с депрессией лечение должно продолжаться достаточный период времени, чтобы гарантировать, устранение симптомов, не менее 6 месяцев.	Рекомендуемая суточная доза составляет 20 мг/день. В течение 3–4 недель после начала лечения, в зависимости от клинической целесообразности и необходимости может быть принято решение о пересмотре и корректировке дозирования
2	Обсесивно-компульсивное расстройство.	В случае хорошего терапевтического эффекта лечение продолжают индивидуально скорректированной дозировкой. Несмотря на то, что систематических исследований, позволяющих определить длительность лечения флуоксетином, не проводилось, ОКР является хроническим заболеванием, поэтому, у пациентов с хорошим клиническим эффектом, целесообразно рассмотреть вопрос о продолжении, спустя 10 недель лечения.	Рекомендуемая суточная доза составляет 20 мг/день. Максимальная суточная доза 60 мг. Если в течение 10 недель не наблюдается улучшение, лечение флуоксетином должно быть пересмотрено.
3	*Булимический невроз.*	Нет данных о долгосрочной эффективности (более 3 месяцев) у пациентов с нервной булимией.	Рекомендуемая суточная доза составляет 60 мг/день.

* Показания к применению согласно утвержденной МОЗ инструкции препарата

2. Противопоказания к назначению препарата:

Повышенная чувствительность к флуоксетина или к любому из других компонентов препарата.

Флуоксетин противопоказан в сочетании с неселективными необратимыми ингибиторами МАО (например, ипрониазидом).

Флуоксетин противопоказан в сочетании с метопрололом, применяемый при сердечной недостаточности.

3. **Основные побочные эффекты и частота их возникновения**

Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщали во время лечения флуоксетином, были головная боль, тошнота, бессонница, усталость и диарея. Интенсивность и частота побочных реакций могут уменьшаться при продолжении терапии и, как правило, не приводят к прекращению терапии.

В таблице ниже приведены побочные реакции, которые наблюдались у взрослых пациентов при лечении флуоксетином. Некоторые из этих побочных реакций являются общими с другими СИОЗС. Частота их возникновения определена следующим образом: очень часто (≥1 / 10), часто (от> 1/100 до <1/10), нечасто (от> 1/1000 до <1/100), редко (от> 1 / 10000 до <1/1000).

Очень часто	Часто	Нечасто	Редко
Со стороны крови и лимфатической системы			
			Тромбоцитопения Нейтропения Лейкопения
Со стороны имунной системы			
			Анафилактические реакции Сывороточная болезнь
Со стороны эндокринной системы			
Нарушения ЦНС	Часто	Головокружение	Несоответствующая секреция антидиуретического гормона
Метаболеские нарушения и расстройства питания			
	Снижение аппетита		Гипонатриэмия
Психические расстройства			
Бессоница	Тревожность	Деперсонализация	Гипомания

	Нервозность Беспокойство Напряженность Снижение либидо Нарушение сна Необычные сновидения	Повышение настроения Эйфоричное настроение Патологическое мышление Патологический оргазм Бруксизм Суицидальные мысли и поведение	Мания Галюцинации Ажитация Панические атаки Спутанность сознания Дисфемия Агрессия
Со стороны нервной системы			
Головная боль	Нарушение внимания Головокружения Дисгевзия Летаргия Сонливость Тремор	Психомоторная гиперактивность Дискинезия Атаксия Нарушение координации движений Миоклонус Нарушение памяти	Судороги Акатизия Букоглоссальный синдром Серотониновый синдром
Со стороны органов зрения			
	Размытое зрения	Мидриаз	

4. **<u>Основные конкуренты:</u>**

№	Торговое название, форма выпуска, дозировки	Действующее вещество	Производитель	Примечание
1	DEPRES CAPS 20MG № 16, 30	Флуоксетин	NOBEL ILAC SAN TUR TURKEY	
2	FLUOXETINE LANNACH CAPS 20MG № 20	Флуоксетин	LANNACHER AUSTRIA	На 10 капсул больше в упаковке
3	FLUOXETINE-ATM CAPS 20MG №20	Флуоксетин	ATM PHARM UZBEKISTAN	На 10 капсул больше в упаковке

5. **<u>СПВ по препарату:</u>**
6.

Свойство	Преимущество	Выгода

30 таблеток в упаковке	Упаковки хватает в среднем на месяц лечения	Выгодно для пациентов
Прием пищи не влияет на биодоступность препарата	Можно применять вне зависимости от приема пищи	Удобно для пациентов
Флуоксетин способствует уменьшению аппетита	Снижается масса тела	Помогает при булемическом неврозе
Селективный ингибитор обратного захвата серотонина	Повышает только уровень медиатора серотонина	Эффективность в лечении депрессии
Селективный ингибитор обратного захвата серотонина	Повышает только уровень медиатора серотонина	Меньше количество побочных эффектов, безопасность применения
Флуоксетин относится к антидепрессантам - стимуляторам	Эффективен при астенической депрессии	Эффективен у больных с тревогой и депрессией
Метаболизируется в печени до активного метаболита норфлуоксетина.	Длительный период полувыведения обусловливает меньший риск развития синдрома отмены в случае резкого	Меньший риск развития синдрома отмены в случае резкого прекращения приёма флуоксетина

	прекращения приёма флуоксетина	
Оказывает анорексигенное действие, может вызывать потерю массы тела	Возможность применения в дополнение к психотерапии для уменьшения не контролированного переедания.	Коррекция массы тела при нервной булимии и ожирении. Нет риска увеличения массы тела как при приеме большинства антидепрессантов.