Infeksiyalar va parazitlar

Albela

Albendazol 400 mg

Tabletka (apelsin ta'mi)

Gelmintga qarshi, benzimidazol (P02CA03)



QISQACHA · **Askaridoz, enterobioz va b.: 400 mg bir marta. 3 yoshdan. Homiladorlikda mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Ichak gelmintozlari: enterobioz, askaridoz, ankilostomoz, trixotsefalyoz, strongiloidoz, tenioz, gimenolepidoz, opistorxoz
- Teri Larva migrans; bolalarda lyamblioz
- Tizimli: exinokokkoz, neyrotsistitserkoz, toksokaroz, trixinellyoz

Dozalash

- Ovqat bilan; kattalar va 3 yoshdan
- Enterobioz, askaridoz, ankilostomoz, trixotsefalyoz: 400 mg BIR MARTA
- Strongiloidoz, tenioz, gimenolepidoz: 400 mg 3 kun
- Opistorxoz, klonorxoz: 400 mg ×2, 3 kun; lyamblioz (3–12 yosh): 400 mg 5 kun
- Tizimli (6 yoshdan): >60 kg 400 mg ×2; <60 kg 15 mg/kg/sut

Mumkin emas

Albendazol yoki komponentga sezuvchanlik; homiladorlik va emizish; homiladorlikni rejalashtirayotgan ayollar (davolash davomida va 1 oy keyin nogormonal kontratsepsiya)

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, bosh aylanishi, epigastral og'riq, ko'ngil aynishi, qusish, diareya, jigar fermentlari oshishi, alopesiya, isitma; kam — leykopeniya, gepatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Keng spektr: tuxum, lichinka va yetuk shakllarga
- 3 haftada tuzalmasa — 2-kurs
- Yog'li ovqat tizimli so'rilishni oshiradi

O'zingizni tekshiring

Askaridozda Albela dozasi?

400 mg bir marta.

Albela qaysi yoshdan?

3 yoshdan.