Alendra



Natriy alendronat 70 mg

Tabletka

Bisfosfonat, suyak rezorbsiyasi ingibitori (M05BA04)

QISQACHA · **70 mg haftasiga 1 marta, ertalab och qoringa, oddiy suv bilan; keyin 30 daqiqa yotmaslik.**

Ko'rsatmalar

- Postmenopauzal osteoporoz (umurtqa va son suyagi sinishi xavfini kamaytiradi)

Dozalash

- HAFTASIGA 1 MARTA 70 mg
- Ertalab, ovqat/ichimlik/doridan kamida 30 daqiqa oldin, faqat ODDIY SUV (≥200 ml) bilan
- Tik turib yoki o'tirib; keyin 30 daqiqa yotmaslik; chaynamaslik, so'rmaslik
- Ovqatda yetarli bo'lmasa kalsiy va vitamin D qo'shish
- O'tkazib yuborilsa — eslagan kunining ertasi ertalab; KK <35 tavsiya etilmaydi; 18 yoshgacha qo'llanmaydi

Mumkin emas

Qizilo'ngach anomaliyalari (striktura, axalaziya); 30 daqiqa tik tura olmaslik; gipokalsiemiya; o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Qorin og'riq, dispepsiya, zarda, qizilo'ngach yarasi, suyak-mushak og'rig'i, bosh og'riq; kam — jag' osteonekrozi, son suyagining atipik sinishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Qabul qoidasiga rioya — samaradorlik va xavfsizlikning asosiy sharti
- Mineral suv, kofe, sharbat so'rilishni kamaytiradi
- Forkal Plyus bilan kalsiy/D ta'minoti (boshqa vaqtda)

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Alendra — osteoporozning oldini olish va davolashda "oltin standart"»

- Yevropa va AQSh ishlab chiqarish standartlari
- Narxi qulay

O'zingizni tekshiring

Alendra qanday ichiladi?
Haftasiga 1 marta, ertalab och qoringa, faqat oddiy suv bilan, tik holatda; 30 daqiqa yotmaslik va ovqat yemaslik.

Alendra uchun QMBH?
Qizilo'ngach anomaliyalari, 30 daqiqa tik tura olmaslik, gipokalsiemiya, o'ta sezuvchanlik.