Pulmonologiya, LOR va allergiya

Askozin Maks



Vitamin C 1000 mg + Rux 10 mg

Shipuchi tabletka (apelsin)

Vitamin C va rux (A11GB)

QISQACHA · **1 tab kuniga 1 marta, 12 yoshdan. Buyrak toshida mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Vitamin C va rux tanqisligini davolash

Dozalash

- Kattalar va 12 yoshdan: 1 tab kuniga 1 marta, 200 ml suvda eritib

Mumkin emas

Buyrak toshi (hozir yoki anamnezda), oksaluriya; og'ir buyrak yetishmovchiligi, dializ; gemoxromatoz; sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Diareya, ko'ngil aynishi, qorin og'riq; allergik reaksiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Rux tetratsiklin va xinolonlar so'rilishini kamaytiradi — 2 soat oldin yoki 4–6 soat keyin
- Aspartam — fenilketonuriyada ehtiyot
- Varfarin samarasini kamaytirishi mumkin

O'zingizni tekshiring

Askozin Maks kimga mumkin emas?

Buyrak toshi/oksaluriya, og'ir buyrak yetishmovchiligi, gemoxromatoz.

Askozin Maks antibiotiklar bilan qanday ichiladi?

Tetratsiklin/xinolonlardan 2 soat oldin yoki 4–6 soat keyin.