
Baktopik surtma



Mupirotsin 2%

Surtma

Mahalliy antibiotik (D06AX09)

QISQACHA · **Kuniga 2–3 marta, 10 kungacha. 2 oylikdan.**

Ko'rsatmalar

- S. aureus (MRSA ham) va streptokokklar keltirgan teri infeksiyalari: impetigo, follikulit, furunkulyoz

Dozalash

- Kattalar va 2 oylikdan bolalar: kuniga 2–3 marta, 10 kungacha
- Bog'lam ostida ham mumkin; 10 kunda samara bo'lmasa qayta baholash

Mumkin emas

Mupirotsinga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Surtilgan joyda achishish; kam — qichishish, qizarish, quruqlik

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Boshqa antibiotiklar bilan kesishgan rezistentlik yo'q (o'ziga xos mexanizm)
- Ko'z va burun ichiga mos emas (buning uchun nazal shakli bor)
- PEG — o'rta/og'ir buyrak yetishmovchiligida ehtiyot

O'zingizni tekshiring

Baktopik surtma qaysi yoshdan?

2 oylikdan.

Baktopik qaysi infeksiyalarda?

Impetigo, follikulit, furunkulyoz (S. aureus, shu jumladan MRSA, streptokokklar).