Baktopik nazal surtma



Mupirotsin kalsiy (mupirotsin 2%)

Burun uchun surtma

Mahalliy antibiotik (D06AX09)

QISQACHA · **Burun teshiklariga kuniga 2–3 marta; tashuvchanlik odatda 5–7 kunda yo'qoladi.**

Ko'rsatmalar

- Stafilokokklar, shu jumladan MRSA ning burun orqali tashuvchanligini bartaraf etish

Dozalash

- Gugurt cho'pi boshidek miqdor har bir burun teshigi ichiga kuniga 2–3 marta
- Keyin burun qanotlarini siqib tarqatish
- Tashuvchanlik odatda 5–7 kunda yo'qoladi

Mumkin emas

Mupirotsinga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Burun shilliq qavati reaksiyalari; juda kam — tizimli allergiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Operatsiyadan oldin va shifoxona ichi infeksiyasi profilaktikasida
- Ko'zga ishlatilmaydi

O'zingizni tekshiring

Baktopik nazal surtmaning ko'rsatmasi?

MRSA va boshqa stafilokokklarning burun orqali tashuvchanligini bartaraf etish.

Necha kunda tashuvchanlik yo'qoladi?

Odatda 5–7 kunda.