Ginekologiya

Banbakt

Klindamitsin 100 mg (fosfat)

Vaginal suppozitoriy

Ginekologik antibakterial (G01AA10)



QISQACHA · **Bakterial vaginoz: 1 sham kuniga 1 marta, 3 kun.**

Ko'rsatmalar

- Homilador bo'lmagan ayollarda bakterial vaginoz — 3 kunlik kurs

Dozalash

- 1 supp kuniga 1 marta, yaxshisi uxlashdan oldin, ketma-ket 3 kun

Mumkin emas

Klindamitsin/linkomitsinga sezuvchanlik; regional enterit, yarali kolit yoki antibiotik bilan bog'liq kolit anamnezi

Nojo'ya ta'sirlar

Vulvovaginal bezovtalik, vaginal og'riq, vaginal kandidoz; kam — psevdomembranoz kolit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Qisqa kurs — 3 kun
- Lateks prezervativ/diafragma — davolashdan keyin 72 soat ishlatmaslik
- Neyro-mushak blokatorlari ta'sirini kuchaytiradi

O'zingizni tekshiring

Banbakt kursi?

1 suppozitoriy kuniga 1 marta, ketma-ket 3 kun.

Banbaktdan keyin lateks kontratseptivlar haqida nima deyish kerak?

72 soat davomida ishlatmaslik — mustahkamligi pasayadi.