Blemish gel

Adapalen 0,1% + Klindamitsin 1%

Gel 15 g

Akne uchun mahalliy kombinatsiya (D10AD53)



QISQACHA · **Kuniga 1 marta kechqurun; samara 8–12 haftada. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Oddiy husnbuzar (akne vulgaris) — mahalliy davo

Dozalash

- Kuniga 1 marta KECHQURUN, toza quruq teriga yupqa qatlam
- Dastlabki haftalarda akne vaqtincha kuchayishi mumkin
- Samara 8–12 haftada; 12 yoshdan

Mumkin emas

Adapalen, klindamitsin yoki linkomitsinga sezuvchanlik; enterit, yarali kolit, antibiotik bilan bog'liq kolit anamnezi; Kron

Nojo'ya ta'sirlar

Quruqlik, qizarish, achishish, qichishish, po'st tashlash; kam — diareya, kolit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Retinoid (komedonlarga) + antibiotik (yallig'lanishga) — ikki mexanizm
- Eritromitsin bilan birga emas; boshqa qitiqlovchi vositalar ehtiyot
- Quyosh/UV dan saqlanish; homiladorlikda tavsiya etilmaydi

O'zingizni tekshiring

Blemish qachon va necha marta surtiladi?

Kuniga 1 marta kechqurun, toza quruq teriga.

Blemish bilan birinchi haftalarda nima bo'lishi mumkin?

Akne vaqtincha kuchayishi — bu davolashni to'xtatish sababi emas.