Dikloseyf

Diklofenak natriy

Rektal supp. 50 / 100 mg

NYaQP (M01AB05)



QISQACHA · 75–150 mg/sut; 100 mg sham kuniga 1 marta kechqurun mumkin. Maks. 150 mg/sut. Proktitda mumkin emas.

Ko'rsatmalar

- Artritlar (RA, OA, ankilozlovchi spondilit, o'tkir podagra)
- Periartrit, tendinit, tenosinovit, bursit
- Jarohatlar, bel og'rig'i, ortopedik/stomatologik/kichik jarrohlikdan keyingi og'riq

Dozalash

- Kattalar: 75–150 mg/sut bir necha marta; 100 mg supp kuniga 1 marta kechqurun mumkin
- Maks. 150 mg/sut (tabletka bilan birga hisoblaganda)
- Defekatsiyadan keyin, faqat rektal; bolalarga tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

Sezuvchanlik; faol yara, qon ketish yoki perforatsiya; NYaQP bilan bog'liq GI qon ketish anamnezi; qaytalanuvchi yara (2+ epizod); homiladorlik III trimestri; jigar va buyrak yetishmovchiligi; yurak yetishmovchiligi NYHA II–IV, YuIK, periferik arteriya/serebrovaskulyar kasallik; ASK/NYaQP chaqirgan astma, angioedema, eshakemi, rinit; PROKTIT

Nojo'ya ta'sirlar

Tez-tez: ko'ngil aynishi, qusish, diareya, dispepsiya, qorin og'riq, bosh og'riq, bosh aylanishi, vertigo, transaminazalar oshishi, toshma; kam: mahalliy yallig'lanish, GI qon ketish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Rektal yo'l — tabletka yuta olmaydigan yoki ko'ngil aynishi bo'lgan bemorga
- Keksalarda minimal doza, GI himoya

O'zingizni tekshiring

Dikloseyf shamining maksimal sutkalik dozasi?

150 mg (boshqa diklofenak shakllari bilan birga).

Dikloseyf shami qachon yuboriladi?

Ichak bo'shatilgandan keyin; 100 mg ni kechqurun kuniga 1 marta qo'llash mumkin.