Diklotol

Aseklofenak

Tabletka 100 mg

NYaQP (M01AB16)



QISQACHA · **Aseklofenak (diklofenak emas) 100 mg kuniga 2 marta, maks. 200 mg/sut.**

Ko'rsatmalar

- Osteoartrit, revmatoid artrit, ankilozlovchi spondilit — og'riq va yallig'lanish
- Tayanch-harakat apparatining boshqa og'riqli kasalliklari (yelka-kurak periartriti, bo'g'imdan tashqari revmatizm)
- Analgetik sifatida: bel og'rig'i, tish og'rig'i, birlamchi dismenoreya

Dozalash

- Kattalar: 100 mg kuniga 2 marta (ertalab va kechqurun); maks. 200 mg/sut
- Yarim stakan suv bilan; ovqat bilan mumkin
- Yengil-o'rta jigar buzilishi: 100 mg/sut; keksalarga tuzatish shart emas

Mumkin emas

Aseklofenak/komponentga sezuvchanlik; faol yoki qaytalanuvchi peptik yara/qon ketish (2+ epizod); ibuprofen, ASK, NYaQP ga allergiya (astma, rinit, angioedema, eshakemi); jigar va buyrak yetishmovchiligi; yurak yetishmovchiligi NYHA II–IV, YuIK, periferik arteriya va serebrovaskulyar kasallik; NYaQP bilan bog'liq qon ketish/perforatsiya anamnezi; qon ketish yoki ivish buzilishi; homiladorlik III trimestri

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh aylanishi, dispepsiya, qorin og'riq, ko'ngil aynishi, diareya, jigar fermentlari oshishi; kam — GI qon ketish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Nomiga qaramay diklofenak EMAS — aseklofenak
- Kuniga 2 marta qulay sxema
- Trombotik xavf diklofenak kabi — yurak-qon tomir xavfida ehtiyot

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Diklotol — artrozli bemorlarni uzoq davolash uchun xondroprotektiv xossali NYaQP»

- Diklofenakka nisbatan me'da-ichak xavfsizligi yaxshiroq — bekor qilish kam
- Tog'ay to'qimasi metabolizmiga ijobiy ta'sir
- Narxi qulay

O'zingizni tekshiring

Diklotolning ta'sir etuvchi moddasi?
Aseklofenak 100 mg (diklofenak emas).

Diklotol dozalash sxemasi?
100 mg kuniga 2 marta, maks. 200 mg/sut.