Domrid

Domperidon

Tabletka 10 mg; suspenziya 1 mg/ml 60/100 ml

Prokinetik, qusishga qarshi (A03FA03)

QISQACHA · **10 mg kuniga 3 marta, maks. 30 mg/sut, 1 haftagacha. Yurak kasalligi va QT uzayishida mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Ko'ngil aynishi va qusish simptomlarini yengillatish

Dozalash

- Kattalar va 12 yoshdan, ≥35 kg: 10 mg (1 tab yoki 10 ml) kuniga 3 marta; maks. 30 mg/sut
- Suspenziya, <35 kg: 0,25 mg/kg kuniga 3 marta; maks. 0,75 mg/kg/sut
- Ovqatdan oldin; davolash 1 HAFTADAN oshmasin

Mumkin emas

Sezuvchanlik; prolaktinoma; o'rta yoki og'ir JIGAR va/yoki BUYRAK buzilishi; QT uzayishi, elektrolit buzilishi, yurak yetishmovchiligi; GI qon ketish, obstruksiya, perforatsiya; kuchli CYP3A4 ingibitorlari va QT uzaytiruvchilar bilan (ketokonazol, eritromitsin, flukonazol, itrakonazol, klaritromitsin, amiodaron va b.)

Nojo'ya ta'sirlar

Prolaktin oshishi (galaktoreya, ginekomastiya), og'iz qurishi, bosh og'riq; kam — QT uzayishi, qorincha aritmiyasi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Periferik ta'sir — ekstrapiramidal NT kam (bolalarda dozani oshirmaslik)
- Ketokonazol, klaritromitsin bilan birga emas

O'zingizni tekshiring

Domridning maksimal sutkalik dozasi va muddati?

30 mg/sut, davolash 1 haftadan oshmaydi.

Domrid tabletkasi qaysi bolalarga mumkin?

12 yoshdan va tana vazni kamida 35 kg bo'lganlarga.