Infeksiyalar va parazitlar

Eszol

Itrakonazol 100 mg

Tabletka

Tizimli antimikotik (J02AC02)



QISQACHA · **Ovqatdan keyin darhol. Vulvovaginal kandidoz: 200 mg kuniga 2 marta, 1 kun.**

Ko'rsatmalar

- Vulvovaginal kandidoz; kepaksimon temiratki; dermatomikozlar; orofaringeal kandidoz
- Onixomikoz
- Gistoplazmoz; tizimli mikozlar (aspergillyoz, kandidoz, kriptokokkoz)

Dozalash

- Ovqatdan keyin darhol, butun yutiladi
- Vulvovaginal kandidoz: 200 mg ×2, 1 kun
- Kepaksimon temiratki: 200 mg ×1, 7 kun
- Tana/chov: 100 mg 15 kun yoki 200 mg 7 kun; oyoq/kaft: 100 mg 30 kun
- Onixomikoz: 200 mg kuniga 1 marta 3 oy

Mumkin emas

Itrakonazolga sezuvchanlik; CYP3A4 substratlari bilan birga (yo'riqnoma jadvali: metadon, dizopiramid, dofetilid, dronedaron, xinidin, galofantrin, astemizol, mizolastin, terfenadin, ergot alkaloidlari, irinotekan va b.)

Nojo'ya ta'sirlar

Tez-tez: bosh og'riq, qorin og'riq, ko'ngil aynishi; tez-tez emas: dispepsiya, qabziyat, meteorizm, diareya, qusish, jigar funksiyasi buzilishi, toshma, qichishish; kam: og'ir gepatotoksiklik, turg'un yurak yetishmovchiligi, eshitish yo'qolishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Kislotalikni kamaytiruvchilar so'rilishni kamaytiradi — nordon ichimlik bilan
- Teri infeksiyasida samara kursdan 1–4 hafta keyin, tirnoqda 6–9 oy keyin ko'rinadi
- Bolalarga tavsiya etilmaydi

O'zingizni tekshiring

Eszol qanday ichiladi?

Ovqatdan keyin darhol, butunligicha.

Onixomikozda Eszol sxemasi?

200 mg kuniga 1 marta, 3 oy.