Ezetum 10000



Pankreatin 150 mg (lipaza 10 000 TB, amilaza 8000 TB, proteaza 600 TB)

Kapsula (ichakda eriydigan minimikrosferalar), 20 (2×10) yoki 100 (10×10)

Poliferment preparat (A09AA02)

QISQACHA · **Ovqat bilan 1–2 kapsula; granulalar chaynalmaydi.**

Ko'rsatmalar

- Oshqozon osti bezining ekzokrin yetishmovchiligi

Dozalash

- Kattalar, keksalar va bolalar: ovqat boshida yoki ovqatdan keyin darhol 1–2 kapsula
- Kerak bo'lsa doza asta oshiriladi
- Butun yutiladi yoki ochib, granulalar nordon ovqat/sharbat (olma pyuresi, yogurt) bilan, CHAYNAMASDAN
- Yetarli suyuqlik ichish

Mumkin emas

> Komponentlarga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Qorin og'riq (juda tez-tez); ko'ngil aynishi, qusish, qabziyat, qorin shishi, diareya; kam — toshma, allergiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Minimikrosferalar me'dada ovqat bilan bir tekis aralashadi, ichakda faollashadi
- Mukovistsidozda >10 000 TB lipaza/kg/sut — fibrozlanuvchi kolonopatiya xavfi
- Retseptsiz

O'zingizni tekshiring

Ezetum qachon ichiladi?

Ovqat boshida yoki ovqatdan keyin darhol, 1–2 kapsula.

Kapsulani yuta olmaydigan bemorga nima deyiladi?

Kapsulani ochib, granulalarni nordon yumshoq ovqat bilan chaynamasdan yutish.