Fizzi

Seknidazol 500 mg

Tabletka

Nitroimidazol, antiprotozoy (P01AB07)



QISQACHA · **Trixomonoz: 2 g bir marta. Davolash davomida va 72 soat keyin spirt mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Urogenital trixomonoz (erkak va ayol)
- Bakterial vaginoz
- Ichak va jigar amebiazi
- Lyamblioz

Dozalash

- Trixomonoz: 4 tab (2 g) BIR MARTA yoki 12 soat oraliq bilan 2 ga bo'lib
- O'tkir ichak amebiazi, lyamblioz: shu sxema
- Simptomsiz sista tashuvchanlik: 1,5 g/sut 3 kun; jigar amebiazi: 1,5 g/sut 5 kun
- Bolalar: 25–30 mg/kg

Mumkin emas

Nitroimidazollarga sezuvchanlik; homiladorlik I trimestri; organik nevrologik buzilish; qon diskraziyasi anamnezi

Nojo'ya ta'sirlar

Qorin og'riq, ko'ngil aynishi, qusish, diareya; metall ta'mi, glossit, stomatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- T½ ≈ 25 soat — bir martalik davo (hamkorlik oson)
- Davolash davomida va 72 soat keyin spirt mumkin emas
- Homilador va emizikli ayollarga qo'llanmaydi

O'zingizni tekshiring

Trixomonozda Fizzi dozasi?

2 g (4 tabletka) bir marta.

Fizzi bilan spirt qachongacha mumkin emas?

Davolash davomida va tugagach 72 soat.