Flutisal

Fluoksetin

Kapsula 20 mg, №30

Antidepressant, SSRI (N06AB03)



QISQACHA · **Depressiya va OKB: 20 mg/sut. Bulimik nevroz: 60 mg/sut.**

Ko'rsatmalar

- Katta depressiv epizodlar
- Obsessiv-kompulsiv buzilish
- Bulimik nevroz (psixoterapiyaga qo'shimcha)

Dozalash

- Depressiya: 20 mg/sut; 3–4 haftada qayta baholash; kamida 6 oy davolash
- OKB: 20 mg/sut, maks. 60 mg; 10 haftada yaxshilanmasa qayta ko'rib chiqish
- Bulimiya: 60 mg/sut
- Bitta yoki bo'lib qabul, ovqatdan qat'i nazar

Mumkin emas

> O'ta sezuvchanlik; noselektiv qaytarilmas MAO ingibitorlari bilan; yurak yetishmovchiligida qo'llanadigan metoprolol bilan

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, ko'ngil aynishi, uyqusizlik, charchoq, diareya; xavotir, libido kamayishi, terlash; kam — giponatriemiya, suitsidal fikrlar

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Nojo'ya ta'sirlar odatda davolash davomida kamayadi
- Oilaviy vrach, nevrolog, psixiatr uchun
- Uzoq T½ — bekor qilish sindromi nisbatan kam

O'zingizni tekshiring

Bulimik nevrozda Flutisal dozasi?

60 mg/sut.

Flutisal qaysi yurak dorisi bilan mumkin emas?

Yurak yetishmovchiligida qo'llanadigan metoprolol bilan.