# Flyut Astezin

**Benzokain 206 mg**

Rektal suppozitoriy, 6 yoki 12 (2×6)

*Mahalliy anestetik — gemorroy va anal yoriqlar uchun (C05AD03)*




**QISQACHA · 1 sham ertalab va kechqurun; maks. 4 sham/sut. 12 yoshdan.**

## Ko'rsatmalar

- Tashqi va ichki gemorroy
- Anus yoriqlari, eroziyalar, mikrojarohatlar; og'riq va perianal qichishish
- Proktologik operatsiyadan keyingi og'riq

## Dozalash

- Gigiyenik muolajadan keyin: ertalab defekatsiyadan keyin va kechqurun uxlashdan oldin 1 supp
- Maks. 4 supp/sut
- Odatda 1 hafta, zarur bo'lsa 3 haftagacha (vrach bilan)

## Mumkin emas

O'ta sezuvchanlik; tromboembolik kasallik; granulotsitopeniya; 12 yoshgacha

## Nojo'ya ta'sirlar

Kam: kontakt dermatit, giperemiya, qichishish; juda kam (yuqori doza) — metgemoglobinemiya (lab va tirnoq ko'karishi, hansirash)

## Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- MAO ingibitorlari, antidepressantlar, gipotenziv dorilar bilan tavsiya etilmaydi
- 7 kundan ortiq qon aralash ajralma bo'lsa — proktologga
- Retseptsiz



**O'zingizni tekshiring**

**Flyut Astezinning maksimal sutkalik dozasi?**

4 suppozitoriy.

**Benzokainning kam uchraydigan xavfli nojo'ya ta'siri?**

Metgemoglobinemiya (teri, lab, tirnoq ko'karishi, hansirash, taxikardiya).