Forsanek

Etorikoksib

Tabletka 60 / 90 / 120 mg, №7 / №28

Selektiv COX-2 ingibitori, koksib (M01AH05)



QISQACHA · **Kuniga 1 marta: OA 30 mg, RA va AS 60 mg, tish operatsiyasidan keyin 90 mg (3 kun), podagra 120 mg (8 kun).**

Ko'rsatmalar

- Osteoartrit, revmatoid artrit, ankilozlovchi spondilit simptomlari (kattalar va 16 yoshdan)
- O'tkir podagrik artritda og'riq va yallig'lanish
- Jarrohlik bilan bog'liq o'rtacha og'riqni qisqa muddat davolash

Dozalash

- Kuniga 1 marta, ovqatdan qat'i nazar
- Osteoartrit: 30 mg (maks. 60 mg)
- RA va ankilozlovchi spondilit: 60 mg (maks. 90 mg)
- O'tkir podagra: 120 mg, maks. 8 kun
- Stomatologik operatsiyadan keyingi og'riq: 90 mg, maks. 3 kun
- Jigar: yengil — maks. 60 mg; o'rta — maks. 30 mg; KK<30 — mumkin emas

Mumkin emas

Faol yara/GI qon ketish; ASK/NYaQP ga allergiya; homiladorlik va laktatsiya; og'ir jigar, KK<30; 16 yoshgacha; yallig'lanishli ichak kasalligi; yurak yetishmovchiligi NYHA II–IV; nazorat qilinmagan AQB >140/90; YuIK, periferik arteriya va serebrovaskulyar kasallik

Nojo'ya ta'sirlar

Qorin og'riq, shish, GIPERTENZIYA, bosh aylanishi, dispepsiya, diareya, ALT/AST oshishi, alveolyar ostit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Me'da prostaglandinlari va trombotsitlarga ta'sir qilmaydi; 90 mg ta'siri ~28 daqiqada boshlanadi
- MEDAL (34 701 bemor): me'da-ichak yuqori bo'limi asoratlari diklofenakdan ~31% kam; jigar sababli bekor qilish 0,3% vs 2,7%
- Trombotik xavf diklofenak bilan bir xil; ASK o'rnini bosmaydi; AQB ni 2 hafta ichida tekshirish

---

O'zingizni tekshiring

O'tkir podagrada Forsanek dozasi va muddati?
120 mg kuniga 1 marta, ko'pi bilan 8 kun.

Forsanekni diklofenakdan ajratib turadigan dalil?
MEDAL dasturi: me'da-ichak asoratlari va jigar tufayli bekor qilish diklofenakdan kam, trombotik xavf esa bir xil.