Infeksiyalar va parazitlar

Fusis

Flukonazol

Tab. 50/100/150/200 mg; Fusis DT 50 mg (bolalar); infuziya 200 mg/100 ml

Tizimli antimikotik, triazol (J02AC01)



QISQACHA · **O'tkir vaginal kandidoz: 150 mg bir marta. Tabletka 6 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Vaginal kandidoz (o'tkir va qaytalanuvchi), kandidozli balanit
- Shilliq qavat kandidozi: og'iz-tomoq, qizilo'ngach, kandiduriya; invaziv kandidoz
- Kriptokokk meningiti, koksidioidomikoz
- Dermatomikozlar, rangli temiratki, onixomikoz; immunosupressiyada profilaktika

Dozalash

- O'tkir vaginal kandidoz/balanit: 150 mg BIR MARTA
- Qaytalanuvchi: 150 mg 1-, 4-, 7-kunlari, keyin haftasiga 150 mg 6 oy
- Og'iz-tomoq: 1-kun 200–400 mg, keyin 100–200 mg 7–21 kun
- Dermatomikoz: 150 mg haftada 1 marta 2–4 hafta; onixomikoz: 150 mg haftada 1 marta tirnoq o'sguncha
- Bolalar (DT): 3 mg/kg (shilliq), 6–12 mg/kg (invaziv)

Mumkin emas

Flukonazol/azollarga sezuvchanlik; 400 mg+ dozada terfenadin bilan; sizaprid, astemizol, pimozid, xinidin, eritromitsin bilan (QT); tabletkalar 6 yoshgacha mumkin emas (bolalarga — Fusis DT); DT: homiladorlik, emizish

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, qorin og'riq, diareya, ko'ngil aynishi, toshma, jigar fermentlari oshishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- T½ ≈ 30 soat — haftada 1 marta qabul mumkin
- DT — suvda eriydi, bolalar uchun qulay; infuziya — og'ir holatlar uchun
- Varfarin va sulfonilmochevina ta'sirini kuchaytiradi

O'zingizni tekshiring

O'tkir vaginal kandidozda Fusis dozasi?

150 mg bir marta.

Qaytalanuvchi vaginal kandidozda Fusis sxemasi?

150 mg 1-, 4-, 7-kunlari, keyin 6 oy haftasiga 150 mg.