Kandigo



Klotrimazol

Vaginal supp. 100 mg / 500 mg; 10% vaginal krem (applikator bilan)

Zamburug'ga qarshi, imidazol (G01AF02)

QISQACHA · **500 mg sham yoki 10% krem — bir marta; 100 mg sham — 3 kun.**

Ko'rsatmalar

- Kandidozli vaginit

Dozalash

- Supp 100 mg: kuniga 1 marta (kechqurun) 3 kun yoki 6 kun
- Supp 500 mg: BIR MARTA kechqurun
- Krem 10%: to'ldirilgan applikator BIR MARTA kechqurun; kerak bo'lsa takrorlash
- Hayz paytida emas; krem 16 yoshgacha qo'llanmaydi

Mumkin emas

> Klotrimazol yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Allergik reaksiya, qichishish, toshma, shish, achishish, qorin og'riq

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- 500 mg va krem — bir martalik davo, qulay
- Lateks kontratseptivlar — 5 kun ehtiyot; takrolimus/sirolimus darajasini oshirishi mumkin
- 7 kunda yaxshilanmasa yoki 6 oyda 2 dan ko'p qaytalansa — vrachga

O'zingizni tekshiring

Kandigo 500 mg qanday qo'llanadi?

Bitta suppozitoriy bir marta kechqurun qinga chuqur.

Kandigodan keyin lateks prezervativ haqida?

Kamida 5 kun ehtiyot choralarini ko'rish — lateks shikastlanishi mumkin.