Nevrologiya

Konfundus

Levodopa 250 mg + Karbidopa 25 mg

Tabletka, №100 (bo'luvchi chiziqli)

Parkinsonga qarshi, dofaminergik (N04BA02)



QISQACHA · **Boshlang'ich ½ tab kuniga 1–2 marta, asta oshiriladi; maks. 8 tab/sut. Birdan to'xtatilmaydi.**

Ko'rsatmalar

- Parkinson kasalligi va parkinsonizm sindromi

Dozalash

- Levodopa olmaganlar: ½ tab kuniga 1–2 marta ovqatdan keyin; har kuni yoki kunora +½ tab
- To'liq samara bir hafta yoki undan ko'proqda
- Levodopa olganlar: levodopani kamida 12 soat (sekin bo'shatiluvchi — 24 soat) oldin to'xtatish; Konfundus dozasi avvalgi levodopa dozasining ~20%
- >1500 mg levodopa olganlar: 1 tab kuniga 3–4 marta; maks. 8 tab/sut (karbidopa 200 mg + levodopa 2 g)
- 18 yoshgacha tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

Noselektiv MAO ingibitorlari (2 hafta oldin to'xtatish), yopiq burchakli glaukoma, shubhali teri o'smalari yoki melanoma anamnezi, og'ir psixoz, o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Diskineziya, ko'ngil aynishi, ortostatik gipotenziya, gallyutsinatsiya, to'satdan uxlab qolish, impuls nazorati buzilishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- 17 yillik klinik tajriba; rivojlangan bosqichda monoterapiya
- "On-off" va doza tugashi fenomenida holatni yaxshilaydi
- ½ tab ×2 da bitta upakovka ~3 oyga yetadi — iqtisodiy; Pramisum, Zoresan, Rekol, Neyrokobal bilan kombinatsiya

O'zingizni tekshiring

Konfundus bilan qaysi MAO ingibitorini birga berish mumkin?
Selektiv MAO-B ingibitori selegilinni tavsiya dozada; noselektiv MAO ingibitorlari mumkin emas.

Konfundus upakovkasi nega iqtisodiy?
100 tabletka: ½ tab kuniga 2 marta qabulda ~3 oyga yetadi.