Laen

Linezolid 600 mg

Tabletka

Oksazolidinon antibiotik (J01XX08)

QISQACHA · **600 mg kuniga 2 marta, 10–14 kun (maks. 28 kun). Uzoq davolashda qon tahlili nazorati.**

Ko'rsatmalar

- Nozokomial va shifoxonadan tashqari pnevmoniya (grammusbat qo'zg'atuvchi)
- Teri va yumshoq to'qimalarning asoratli infeksiyalari (grammusbat, shu jumladan MRSA)

Dozalash

- 600 mg kuniga 2 marta (har 12 soatda), odatda 10–14 kun, maks. 28 kun
- Ovqatdan qat'i nazar; v/i dan peroralga o'tishda doza o'zgarmaydi
- Faqat statsionarda, mutaxassis bilan maslahatdan keyin; 18 yoshgacha tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

Linezolid/komponentga sezuvchanlik; MAO A yoki B ingibitorlari bilan yoki ulardan 2 hafta ichida; AQB monitoringisiz: nazorat qilinmagan gipertenziya, feoxromotsitoma, karsinoid, tireotoksikoz, bipolyar depressiya, shizoaffektiv buzilish, o'tkir chalkashlik; SSRI, TTsA, triptanlar, simpatomimetiklar, dofaminergik vositalar, petidin, buspiron qabul qilayotganlar; emizish to'xtatiladi

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, diareya, ko'ngil aynishi; MIYELOSUPRESSIYA (>2 hafta — haftalik qon tahlili); neyropatiya (>28 kun), laktatsidoz

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Grammanfiyga ta'sir qilmaydi — aralash infeksiyada kombinatsiya kerak
- O'zi MAO ingibitori: serotoninergik dorilar (masalan Dezestra) bilan xavfli
- Tiraminga boy ovqatlarni ko'p iste'mol qilmaslik

O'zingizni tekshiring

Laen qaysi bakteriyalarga ta'sir qilmaydi?

Grammanfiy bakteriyalarga.

Laen bilan 2 haftadan ortiq davolashda nima nazorat qilinadi?

Qonning umumiy tahlili (trombotsitlar, gemoglobin) — haftalik.